

KATALOG ISHRANE BILJA


2026.

• RATARSTVO
• VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO
• POVRTARSTVO



OD 2018.
PONOSNI VLASNICI MEDALJE
ZA KVALITET TEČNIH ĐUBRIVA

Sa ponosom ističemo da smo vlasnici medalje za kvalitet u kategoriji tečnih đubriva, na osnovu istraživanja internacionalne, nezavisne, sertifikacione agencije ICERTIAS (International Certification Association GmbH - Switzerland) na teritoriji Republike Srbije i Republike BiH.



OD 2022.
PONOSNI VLASNICI
ECOCERT SERTIFIKATA

Pored kvaliteta proizvoda koji potvrđuje kompanija ICERTIAS, naši proizvodi prepoznati su i od strane sertifikovane agencije ECOCERT. Određeni proizvodi iz našeg portfolija sada zvanično nose sertifikat ORGANSKIH PROIZVODA.

SADRŽAJ

ECOCERT	01	EFEKTI PRIMENE	
SADRŽAJ	02	SPEED for SOIL PROIZVODA	46 - 47
FERTICO	03	EFEKTI PRIMENE	
STRUČNA SLUŽBA ZA ISHRANU BILJA	04 - 05	SPEED for SEED PROIZVODA	48 - 49
POLYFLEX	06 - 07	FitoCrop NPK 12:11:18	50
BIOSTIMULATIVNA ĐUBRIVA	08 - 09	FitoCrop NPK+S 8-20-30 (3)	51
ĐUBRIVA NA BAZI		FFERTIPLUS 4-3-3	52 - 53
KALCIJUMA I MAGNEZIJUMA	10 - 11	KEKKILA PROFESIONAL	54 - 55
MIKROELEMENTARNA ĐUBRIVA	12 - 15	ISHRANA VOĆA	56 - 75
TEČNA BIOSTIMULATIVNA ĐUBRIVA	16 - 17	ISHRANA POVRĆA	76 - 93
KRISTALNA NPK ĐUBRIVA	18 - 20	BELEŠKE	94 - 95
SPECIJALIZOVANA KRISTALNA ĐUBRIVA		KONTAKTI	96
ZA ISHRANU BOROVNICE	21		
OPLEMENJIVAČI ZEMLJIŠTA I VODE	22 - 23		
sea ENERGY	24 - 29		
FITOBIOTIC	30 - 31		
SPEED	32		
SPEED TEHNOLOGIJA	33		
EFEKTI PRIMENE			
SPEED for PLANT PROIZVODA	34 - 37		
ŠTA JE POTREBNO STRNIM ŽITIMA?			
PŠENICA - JEČAM	38 - 39		
KOJE SU POTREBE KUKURUZA?	40		
ŠTA JE POTREBNO SOJI I SUNCOKRETU?			
SOJA	41		
SUNCOKRET	42		
POTREBE ULJANE REPICE ZA RAST I RAZVOJ?	43		
ŠTA JE NEOPHODNO ŠEĆERNOJ REPI?	44		



Fertico fabrika, kao deo **Agromarket grupe**, već dve decenije posvećena je jednoj misiji – unapređenju poljoprivredne prakse kroz inovacije i kvalitet. Naša đubriva nisu samo proizvodi; ona su ključ za ostvarenje punog potencijala svake biljke, na svakom zemljištu.


Fitofert i Speed brendovi postavljaju standarde u ishrani biljaka, dok naši mikrobiološki proizvodi donose novu dimenziju održive poljoprivrede. Poboljšanjem kvaliteta zemljišta, klijavosti semena i otpornosti biljaka na stres i bolesti, gradimo otpornu i produktivnu budućnost poljoprivrede.


Posvećeni smo neprekidnom istraživanju i razvoju, čime omogućavamo implementaciju najnovijih tehnologija u proizvodnji. Naša laboratorija, u saradnji sa renomiranim biotehnološkim institutima, garantuje najviši nivo kvaliteta i efikasnosti svakog proizvoda. U kombinaciji sa našim visoko modernizovanim proizvodnim pogonom, Fertico je sinonim za pouzdanost i inovacije.

Naša tehnologija nije samo inovativna – ona je promišljena, inspirisana prirodom i posvećena budućnosti.



LEGENDA





LEGENDA

- DC BEOGRAD
- DC Kragujevac
- DC NIŠ
- DC SR. MITROVICA
- DC SOMBOR
- DC ZRENJANIN
- DC VALJEVO
- DC SARAJEVO
- DC BIJELJINA
- DC PRIŠTINA
- DC BANJA LUKA
- DC PODGORICA
- DC PODGORICA

STRUČNA SLUŽBA
ZA ISHRANU BILJA



DC Kragujevac
MARKO ĐOKIĆ
dipl. inž. zaštite bilja
+381 63 86 43 498
marko.djokic@agromarket.rs



DC Kragujevac
MILOŠ TODOROVIĆ
mast. inž. poljoprivrede
+381 69 80 37 225
milos.todorovic@agromarket.rs



DC NIŠ
GORAN RADOVANOVIĆ
dipl. inž. ratartstva i povrtarstva
+381 69 50 70 979
goran.radovanovic@agromarket.rs



DC NIŠ
MARKO MITIĆ
dipl. inž. poljoprivrede
+381 69 50 70 995
marko.mitic@agromarket.rs



DC SREMSKA MITROVICA
ALEKSANDAR TRŠIĆ
dipl. inž. poljoprivrede
+381 69 30 80 053
aleksandar.trsic@agromarket.rs



DC ZRENJANIN
VLADIMIR SABLJAK
dipl. inž. ratartstva i povrtarstva
+381 62 31 27 08
vladimir.sabljak@agromarket.rs



DC SOMBOR
MIODRAG OBRADOVIĆ
dipl. inž. vočarstva i vinogradarstva
+381 62 31 12 78
miodrag.obradovic@agromarket.rs



DC VALJEVO
ĐORĐE ĐURIĆ
dipl. inž. vočarstva
+381 62 31 07 15
djordje.djuric@agromarket.rs



DC PODGORICA
MIROSLAV JOKIĆ
dipl. inž. poljoprivrede
+382 69 30 08 45
jokic.miroslav@agromarket.rs



DC BIJELJINA
SLOBODAN KRŠMANOVIĆ
dr. biotehničkih nauka
+387 65 24 25 79
slobodan.kršmanovic@agromarket.rs



DC SARAJEVO
OMER OMERBEGOVIĆ
mast. inž. poljoprivrede
+387 66 76 89 67
omer.omerbegovic@agromarket.rs



DC BANJA LUKA
ŽIVAN MITROVIĆ
dipl. inž. zaštite bilja
+387 65 69 35 01
zivan.mitrovic@agromarket.rs



DC PRIŠTINA
NEXHAT MAXHUNI
dipl. inž. agroekonomije
+383 49 73 38 72
nexhat.maxhuni@agromarket-ks.com



DC PRIŠTINA
SHAIP MORINA
dipl. inž. agroekonomije
+383 49 73 36 75
shaip.morina@agromarket-ks.com



DIR. STRUČNE SLUŽBE
MILOŠ PAVLOVIĆ
mast. inž. za melioracije zemljišta
+381 69 50 75 392
milos.pavlovic@agromarket.rs



DC BEOGRAD
NEMANJA BOŽIĆ
dipl. inž. poljoprivrede
+381 69 50 70 444
nemanja.bozic@agromarket.rs



DC Kragujevac
SANJA PERIŠIĆ
dipl. inž. poljoprivrede
+381 63 32 83 77
sanja.perisic@agromarket.rs

FITŮFERT

POLYFLEX

ZA JAČI KOREN I OTPORNIJE BILJKE



- Praškasti, univerzalni biostimulator
- Visok udeo algi i aminokiselina. uz dodatak fulvokiselina, azota i kalijuma.
- Namenjen jačanju biljke, poboljšanju ishrane i metabolizma, kao i ublažavanju stresnih faktora (suša, hladnoća, toplota, grad...)
- Ubrzava oporavak nakon stresa i povećava sintezu hlorofila
- Jača ćelijski zid i energetska stabilnost.
- Stimuliše rast korenovog sistema, kao i vegetativni rast putem ekstrakta algi i prirodnih hormona.
- Povećava usvajanje mikroelemenata zahvaljujući fulvinskoj kiselini.
- Unapređuje cvetanje i oplodnju → povećava prinos
- Poboljšava otpornost na bolesti.
- Kompatibilan sa većinom đubriva i pesticida.

Hranljivi elementi:	Sadržaj:
Ukupni azot (N)	5 %
Organski ai zot (Norg)	5 %
K ₂ O	5 %
(Zn)	0,4 %
Organski ugljenik (Corg)	30 %



pH (0.1 %) 7.35

EC (0.1 %) 1.30



EFEKTI PRIMENE BIOSTIMULATORA



POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI

- ubrzanjem metabolizma
- poboljšanjem fotosintetske aktivnosti
- boljom sintezom hlorofila



POBOLJŠANJE SINTEZE FITOHORMONA

- podsticajem proizvodnje fitohormona
- balansiranjem potrebnih fitohormona u određenim fenofazama rasta



OPTIMIZACIJA UPOTREBE VODE

- regulacijom otvaranja stoma i kontrolisanom transpiracijom
- održavanjem turgora unutar ćelija



RAZVOJ MEHANIZAMA OTPORNOSTI I REZISTENTNOSTI

- uticajem delovanja abiotskih i biotskih stresnih faktora



POBOLJŠANJE STRUKTURE ZEMLJIŠTA

- (fertigacionom primenom)
- razgradnjom organske materije i stvaranjem humusa



POVEĆANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI

- (fertigacionom primenom)
- jedinjenjima koje sadrže, često mogu uticati na povećanje broja korisnih mikroorganizama i njihove efikasnosti

★ BIOFLEX-L

- Tečno biostimulativno đubrivo visokog stepena efikasnosti
- Formulirano na bazi algi (30 % algi)
- Brzo vidljivi efekti na gajenim biljkama
- Stimuliše vegetativni porast, deobu meristemskih ćelija, kvalitetnije formiranje i naliivanje plodova
- Doprinosi zdravijim i prinosnijim usevima
- Primenjuje se tokom celokupnog vegetacionog perioda
- Primena: Folijarno u koncentraciji od 0.3 % do 1 % (voćarstvo 2-4 l/ha, ratarstvo 1 l/ha, povrtarstvo 0.3 do 0.5%).
- **Sadržaj ekstrakta algi: ≈ 360 g/l**

N: 5 %

K₂O: 4 %

Org. C: Min. 4 %

Sadržaj algi: 25 %



pH (0.1 %) 8.7

EC (0.1 %) 0.3

★ BIOFLEX-P

- Praškasto biostimulativno đubrivo visoke efikasnosti
- Formulirano na bazi algi (40 % algi) uz dodatak aminokiselina (40%).
- Brzo vidljivi efekti na gajenim biljkama.
- Stimuliše vegetativni porast, deobu meristemskih ćelija, kvalitetnije formiranje i naliivanje plodova
- Doprinosi zdravijim i prinosnijim usevima
- Primenjuje se tokom celokupnog vegetacionog perioda
- Primena: Fertigaciono 1-3 kg/ha
- **Sadržaj ekstrakta algi: ≈ 400 g/kg**

N: 5 %

K₂O: 5 %

MgO: 2 %

Sadržaj algi: 85 %



pH (0.1 %) 8

EC (0.1 %) 0.6

★ AMINOFLEX 25

- Tečno biostimulativno đubrivo na bazi slobodnih aminokiselina biljnog porekla
- Stimulativno deluje na rast i razvoj biljaka, naročito u uslovima stresa (hladnoća, visoka temperatura, grad, fitotoksija...)
- Doprinosi kvalitetnijoj izgradnji ćelijskog zida, sintezi hlorofila, oplodnji i drugim enzimskim procesima
- Primena: folijarno u koncentraciji od 0.1 do 0.5 % (voćarstvo 2-3 l/ha, ratarstvo 1-2 l/ha, povrtarstvo 0.1-0.3%)
- **Sadržaj aminokiselina: 275 g/l**

Slobodne aminokiseline: 25 %

N: 5 %



pH (0.1 %) 8

EC (0.1 %) 0.15

★ AMINOMAX 80

- Biostimulativno praškasto đubrivo na bazi amino-kiselina biljnog porekla
- Jedinstven proizvod zbog jako visokog sadržaja aminokiselina stimulativno deluje na rast i razvoj biljaka, naročito u uslovima stresa (hladnoća, visoka temperatura, grad, fitotoksija...)
- Primena: folijarno u koncentraciji od 0.08 do 0.3 % (voćarstvo 1 kg/ha, ratarstvo 0.2-0.3 kg/ha, povrtarstvo 0.08 - 0.1 %)
- **Sadržaj aminokiselina: 800 g/kg**

Ukupne aminokiseline: 80 %

Slobodne aminokiseline: 70 %

N: 14 %



pH (0.1 %) 4.6

EC (0.1 %) 0.3


Aminokiseline: (L-Asp, L-Thr, L-Ser, L-Glu, L-Pro, L-Gly, L-Ala, L-Cys, L-Val, L-Met, L-Ile, L-Leu, L-Tyr, L-Trp, L-Phe, L-His, L-Arg, L-Lys)

ĐUBRIVA NA BAZI KALCIJUMA I MAGNEZIJUMA

Kalcijum je esencijalni hranljivi element i igra važnu ulogu u sledećim fiziološkim procesima: razvoj i rast ćelija, izgradnja i jačanje ćelijskog zida, metabolički procesi i aktivacija usvajanja drugih hranljivih elemenata, enzimsko-hormonalni procesi.

Reguliše funkciju stoma i utiče na ublažavanje temperaturnog stresa. Indukuje otpornost biljaka na patogene. Količina usvojenog kalcijuma kod povrća i voća utiče kako na prinos, tako još više na kvalitet, trajnost i transportabilnost plodova.

Pojedine biljne vrste su jako osetljive na nedostatak kalcijuma, koji se manifestuje određenim simptomima deficita na plodovima, čime se drastično smanjuje njihov kvalitet a posledično i cena. Zato je neophodan pravovremeni tretman useva i zasada nekim od formulacija đubriva na bazi kalcijuma.



MAGNI-CAL B

- Tečno folijarno đubrivo na bazi kalcijuma i magnezijuma, uz prateći sadržaj bora
- Idealan za primenu u voću i povrću, od početka pa do sredine vegetacije
- Lako usvojiv oblik kalcijuma, preporučljiv za primenu u početnim stadijumima formiranja i nalivanja plodova
- Prisustvo bora pospešuje usvajanje kalcijuma i pomaže biljci u periodu oplodnje
- Eliminira pojavu simptoma deficita magnezijuma kod biljaka
- Primena: voćarstvo 3-5 l/ha, povrtarstvo 0.3 do 0-5 %
- **Sadržaj CaO u proizvodu: 205,5 g/l**

N: 10 %

CaO: 15 %

B: 0.2 %

MgO: 2 %

+ME (Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)



pH (0.1 %) 3-6

EC (0.1 %) 1

CAL-AMINO 15

- Tečno folijarno đubrivo na bazi kalcijuma i aminokiselina
- Namenjeno za voćarske i povrtarske zasade nakon obrazovanja ploda pa sve do pojave pigmentacije plodova
- Idealno bi bilo tretmane obaviti na temperaturama vazduha do 25 stepeni
- Primena: voćarstvo 3 do 5 l/ha, povrtarstvo 0.3 do 0.5 %
- **Sadržaj CaO u proizvodu: 210 g/l**

CaO: 15 %

Zn: 0.6 %

Mn: 0.6 %



pH (0.1 %) 7

EC (0.1 %) 0.8

CALCIUM ORGANO 30

- Vodotopivi prah na bazi organski vezanog kalcijuma
- Niska EC vrednost
- Koristi se pred berbu i/ili u toku berbe
- Održava optimalnu tvrdoću i transportabilnost plodova
- Kompatibilan za mešanje
- Primena: u voćarstvu od 2 do 4 kg/ha, u povrtarstvu od 0.2 % do 0.5 %
- **Sadržaj organski vezanog CaO: 300 g/kg**

CaO: 30 %

Org. C: 8 %



pH (0.1 %) 6.5

EC (0.1 %) 0.9

Mg-MAX

- Vodotopivi prah na bazi helatno vezanog magnezijuma (Mg)
- Lakše je usvojiv od svih drugih oblika magnezijuma
- Utiče na bržu sintezu hlorofila
- Brz efekat na tretiranim biljkama
- Primena: Folijarno od 0.1 % do 0.3 % fertigaciono 3-5 kg/ha.
- **Sadržaj organski vezanog MgO: 70 g/kg**

P₂O₅: 5 %

K₂O: 3 %

MgO: 7 %

Org. C: >8 %



pH (0.1 %) 3

EC (0.1 %) 0.6

MIKROELEMENTARNA ĐUBRIVA

Mikroelementi, kao soli, a još češće kao joni, nalaze se u svakoj ćeliji. Oni su gradivni sastojci mnogih organskih jedinjenja i funkcionalni faktori biohemijskih reakcija. Prisustvo ili odsustvo nekog elementa u njima može imati razne neželjene posledice i iz tog razloga su svi elementi esencijalni, tj. podjednako važni za potpun životni ciklus.

Stoga je linija mikroelementarnih đubriva kreirana da upotpuni sve deficite koji mogu nastati u biljkama usled nedostataka pojedinačnih ili grupe hranljivih elemenata.



COMBIVIT COMPLEX 14

- Praškasto đubrivo na bazi mikroelemenata u obliku DTPA i EDTA helatnih kompleksa
- Sadrži gvožđe, cink, mangan, bakar, bor i molibden
- Primenjuje se folijarno i fertigaciono
- Prilagodljiv svim tipovima zemljišta
- Primena: folijarno od 0.2% do 0.5%, fertigaciono od 2 kg/ha do 5 kg/ha.
- **Ukupni sadržaj: AK 4%**

B: 3 %

Cu (EDTA): 1 %

Fe (DTPA): 3 %

Mn (EDTA): 3 %

Mo: 1 %

Zn (EDTA): 3 %



pH (0.1%) 7.7

EC (0.1%) 0.4

CINK ORGANO 14

- Praškasto đubrivo na bazi cinka (Zn) u EDTA helatnom kompleksu.
- Doprinosi bržem metabolizmu azota u biljci.
- Rešava simptome nedostatka cinka kod gajenih biljaka.
- Preporuka je da se koristi preventivno na alkalnim zemljištima (pri pH vrednostima višim od 7).
- Primena: folijarno od 0.1% do 0.2%, fertigaciono od 2 do 10 kg/ha.
- **Sadržaj Zn u proizvodu: 140 g/kg**

Zn (EDTA): 14 %



pH (0.1%) 5.9

EC (0.1%) 0.4

BOR-AMIN 150

- Tečno đubrivo na bazi bora, u obliku etanol-aminskog bora.
- Pogodan za folijarne tretmane.
- Primena: od 1 do 2 l/ha.
- **Sadržaj B u proizvodu: 150 g/l**

B: 10.8 %



pH (0.1%) 8.9

EC (0.1%) 0.2

BORMAX 20

- Vodotopivi prah na bazi bora (B).
- Sadrži 20% bora u obliku lako usvojivog boratnog anjona (dinatrijum oktaborat tetrahidrat).
- Namenjeno pre svega za folijarne tretmane.
- Primena: folijarno od 1 do 2 kg/ha.
- **Sadržaj B u proizvodu: 200 g/kg**

B: 20 %



pH (0.1%) 8.5

EC (0.1%) 0.3

FERRO MAX 11

- Praškasto đubrivo na bazi gvožđa u obliku DTPA helatnog kompleksa
- Idealan za primenu preko sistema kap po kap na kiselim, blago kiselim i neutralnim zemljištima
- Folijarno se primenjuje, kao dopunska ishrana, na svim tipovima zemljišta, od kiselih do baznih
- Primena: folijarno od 0.1% do 0.2 %, fertigaciono od 2 do 5 kg/ha
- **Sadržaj Fe u proizvodu: 110 g/kg**



Fe (DTPA) : 11 %

pH (0.1 %) 3.3

EC (0.1 %) 0.3

FERRO CHELL 6

- Praškasto đubrivo na bazi gvožđa u obliku EDDHA helatnog kompleksa
- Namenjen za fertigacionu primenu
- Jako dobro deluje i usvaja se u širokom pH opsegu (pH vrednost od 3 do 10)
- Reaguje jako dobro čak i na karbonatnim zemljištima
- Primena: fertigaciono od 2 do 5 kg/ha
- **Sadržaj Fe u proizvodu: 60 g/kg**



Fe (EDDHA) : 6 %

pH (0.1 %) 8

EC (0.1 %) 0.5

CUPRO FLO

- Tečni, dualni kompleks bakra iz karbonata (glicinat + glukonat)
- Doprinosi pravilnom funkcionisanju enzima, stabilnosti ćelijskog zida i metabolizmu biljaka
- Pomaže u prevenciji i korekciji nedostatka bakra, naročito u intenzivnoj proizvodnji
- Namenjeno za ishranu svih gajenih biljaka i na otvorenom i u zaštićenom prostoru.
- Primena: folijarno 0,2–0,4% (200–400 ml u 100 l vode), fertigacijom: 0,1% (1 l / 1000 l vode) ili 3–4 l/ha



Cu : 6 %

pH (0.1 %) 6.65

EC (0.1 %) 0.70

ENOVIT

- Praškasto biostimulativno đubrivo na bazi kompleksa aminokiselina biljnog porekla i ekstrakta algi, sa dodatkom mikroelemenata i magnezijuma namenjenoj vinovoj lozi.
- Stimulativno deluje na rast i razvoj, naročito u uslovima stresa.
- Preporučuje se primena 2-3 puta u toku godine, od početka vegetacije pa sve do kraja berbe.
- Naročito u fazi cvetanja i formiranja bobica, kao i u tretmanima nakon berbe
- Primena: folijarno 0,2–0,5%, fertigacijom: 0,1%



MgO: 3 %

Mo: 1 %

Zn (EDTA): 2 %

B: 1 %

Mn (EDTA): 2.5 %

Fe (DTPA): 2.5 %

pH (0.1 %) 7

EC (0.1 %) 0.9

FERRO VIT 6

- Tečno đubrivo sa gvožđem u DTPA helatnom obliku
- Namenjeno za prevenciju i korekciju nedostatka gvožđa kod svih biljnih vrsta
- Posebno efikasno na zemljištima sa povišenim pH vrednostima, gde je gvožđe slabo dostupno
- Sprečava pojavu hloroze i podstiče sintezu hlorofila
- Preporuka je da se koristi preventivno na svim tipovima zemljišta
- Primena: folijarno: 0,5% (0,5 kg u 100 l vode), fertigaciono (u zavisnosti od pH zemljišta supstrata): 0,5% (0,5 kg u 100 l vode) (pH 3,5–5,5 → 2–3 l/ha, pH 5,5–7,0 → 3–5 l/ha, pH > 7,0 → 5–10 l/ha)



Fe (DTPA): 6 %

pH (0.1 %) 6

EC (0.1 %) 0.8

MANGAN ORGANO 12

- Praškasto đubrivo na bazi mangana (Mn) u obliku EDTA helatnog kompleksa
- Sprečava nekrozu vršnog dela lišća koja može nastati usled nedostatka ovog mikroelementa u zemljištu
- Preporuka je da se koristi preventivno na alkalnim zemljištima (na pH vrednostima višim od 7)
- Primena: folijarno od 0.1% do 0.2%, fertigaciono od 2 do 5 kg/ha
- **Sadržaj Mn u proizvodu: 120 g/kg**



Mn (EDTA): 12 %

pH (0.1 %) 7.4

EC (0.1 %) 0.4



TEČNA BIOSTIMULATIVNA ĐUBRIVA



Linija univerzalnih tečnih đubriva za sve biljne vrste. Specifično formulisana za različite namene i fenofaze.

Od početnih fenofaza kada je neophodno uticati na sam start biljaka i obezbediti im dobro ukorenjavanje, do krajnjih faza kada je za naliivanje i sazrevanje plodova neophodno obezbediti dovoljno lako usvojivog kalijuma.





MULTICROP

- Univerzano tečno NPK đubrivo
- Namenjeno za ishranu širokog spektra biljnih vrsta: voća, vinove loze, povrća i ratarskih kultura
- Precizna formulacija u najvećoj meri odgovara potrebama ishrane duvana
- Posebno efikasno u fazama intenzivnog porasta, formiranja plodova i prinosa
- Pobjljšava ishranu, vitalnost biljaka i efikasnost usvajanja hraniva iz zemljišta
- Primena: folijarno: 0,2% (2–3 l/ha), fertigaciono: 5–10 l/ha





NITRAMIN

- Tečno đubrivo sa visokim sadržajem ukupnog azota
- Omogućava brzo početno delovanje (nitratni azot) uz produženo i stabilno snabdevanje biljke azotom
- Namenjen za ishranu svih biljnih vrsta u intenzivnoj fazi vegetacije
- Podržava snažan porast vegetativne mase i intenzivan metabolizam biljaka
- Primena: folijarno 0,6% (2–5 l/ha), fertigaciono: 2–10 l/ha



HUMISTART



- Tečno biostimulativno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora
- Sadrži huminske kiseline
- Oplemenjeno ekstraktom algi
- Sadrži mikroelemente
- Idealno za kombinovanje sa startnim đubrivima u fertigaciji
- Osnovna namena za folijarne tretmane na početku vegetacije, ali i posle berbe za bolju pripremu rodnosti biljaka u narednoj godini
- Primena: folijarno 0.3% - 1% i fertigaciono 0.1%



• HA-Huminska kiselina,
• AA-Aminokiselina
• EA-Ekstrakt algi

HUMISUPER PLUS



- Tečno biostimulativno NPK đubrivo sa izbalansiranim odnosom azota i kalijuma (1:1)
- Visok sadržaj ugljenih hidrata, betaina i lignosulfonata
- Sadrži mikroelemente
- Obezbeđuje biljci lako usvojive hranljive materije
- Pozitivno utiče na biljne vrste u uslovima stresa
- Primena: folijarno u koncentraciji od 0.3% do 1% i fertigaciono 0.1%



• AA-Aminokiselina,
• OS-Oligo saharidi



K-COMPLEX 20

- Tečno kalijumovo đubrivo visoke efikasnosti
- Helatni oblik kalijuma, višestruko brže usvojiv u odnosu na ostale vrste kalijuma
- Namenjen za tretmane voća i povrća u kasnijim fazama razvoja
- Najčešće se primenjuje pred berbu i u samoj berbi
- Utiče na brže sazrevanje i bolju pigmentaciju plodova
- Primena: folijarno u koncentraciji od 0.3% do 0.5%
- Sadržaj organski vezanog K: 270 g/l



LIQUID 12-4-6

- Tečno folijarno đubrivo sa naglašenim sadržajem azota
- Namenjeno za primenu u periodu intenzivnog porasta biljaka
- Stimuliše formiranje lisne mase i vegetativni porast
- Sadrži mikroelemente
- Primena: folijarno 0.3% - 1%



KRISTALNA NPK ĐUBRIVA

Seriya vodotopivih mineralnih đubriva, prilagođena različitim fenofazama biljaka, od ukorenjavanja do pigmentacije i sazrevanja plodova. Đubriva su formulisana od sirovina visoke čistoće, što obezbeđuje brzo i lako rastvaranje. Pored osnovnih NPK elemenata, đubriva su formulisana i sa mikroelementima od kojih su svi katjoni helatizirani u obliku EDTA, odnosno (Fe) DTPA kompleksa.



Namenjena su za potpunu ishranu biljaka hranljivim rastvorom ili dopunsku folijarnu primenu. Pri fertigacionoj primeni, radna koncentracija je do 0,1% (1 kg na 1000 litara vode) dok se u folijarnoj primeni koncentracije kreću od 0.3 - 0.5 % (100 - 500 grama na 100 litara vode), dok koncentracija pripremnog koncentrovanog rastvora ne sme prelaziti 10% (max 1kg/10l vode).

- **Maksimalna rastvorljivost đubriva u vodi:** 200 g/kg





START 10-45-10+ME

- Povišen sadržaj lako usvojivog fosfora, uz prateći sadržaj azota, kalijuma, i helatnih mikroelemenata
- Stimuliše ukorenjavanje i pravilan razvoj korenovog sistema
- Inicira formiranje i razvoj generativnih organa biljaka





20-20-20+ME

- Izbalansiran odnos NPK elemenata, uz dodatak mikroelemenata
- Stimuliše rast vegetativne mase
- Univerzalno đubrivo za fertigaciju i folijarno prihranjivanje biljaka





NITRO 25-5-10+2MgO+ME

- NPK formulacija sa visokim sadržajem azota (nitratni i amonijačni), uz dodatak magnezijuma i mikroelemenata
- Stimuliše rast i razvoj vegetativne mase biljaka



FINALE 5-10-45+ME

- NPK formulacija sa visokim sadržajem sulfatnog kalijuma, uz dodatak helatnih mikroelemenata
- Stimuliše sazrevanje i pigmentaciju plodova
- Fertigaciono se primenjuje pred početak pigmenatcije plodova
- Folijarno se primenjuje kada je neophodna dopunska primena kalijuma
- Najfrekventnija primena kod ishrane luka i kupusnjača, zbog prisustva sulfata



TOMATO 12.5-6-31+4MgO+ME

- Namenska NPK formulacija sa dodatkom magnezijuma i mikroelemenata
- Namenjen za gajenje paradajza i ostalog povrća
- Koristi se u svim fenofazama razvića u varijabilnoj količini primene, zavisno od uslova na terenu

N: 12.5 %

N-NO₃: 10 %

N-NH₄: 2.5 %

P₂O₅: 6 %

K₂O: 31 %

MgO: 4 %

SO₃: 6.25 %

+ME (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)



pH (0.1 %) 3.90

EC (0.1 %) 1.27

PEPPER 11-7-33+4MgO+ME

- Savršena NPK formula za zasade paprike, uz dodatak magnezijuma i mikroelemenata
- Pruža optimalnu ishranu paprike u svim fenofazama njenog razvića, od ukorenjavanja do kraja berbe

N: 11 %

N-NO₃: 9.5 %

N-NH₄: 1.5 %

P₂O₅: 7 %

K₂O: 33 %

MgO: 4 %

SO₃: 6.25 %

+ME (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)



pH (0.1 %) 3.90

EC (0.1 %) 1.27

MELON 14-7-28+3.5MgO+ME

- Specijalna NPK formulacija sa dodatkom magnezijuma i mikroelemenata
- Namenjen za gajenje krastavca, kornišona, lubenice, dinje i tikvice
- Pruža optimalnu ishranu biljaka u periodu od cvetanja do berbe

N: 14 %

N-NO₃: 10.5 %

N-NH₄: 3.5 %

P₂O₅: 7 %

K₂O: 28 %

MgO: 3.5 %

SO₃: 6.25 %

+ME (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)



pH (0.1 %) 3.95

EC (0.1 %) 1.29

BERRY 14-8-30+2MgO+ME

- Namensko đubrivo za jagodičasto i ostalo voće
- Formulacija koja u potpunosti pruža optimalne količine hranljivih elemenata tokom većeg dela vegetacionog perioda

N: 14 %

N-NO₃: 10.5 %

N-NH₄: 3.5 %

P₂O₅: 8 %

K₂O: 30 %

MgO: 2 %

+ME (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)



pH (0.1 %) 3.90

EC (0.1 %) 1.30

SPECIJALIZOVANA KRISTALNA ĐUBRIVA ZA ISHRANU BOROVNICE

Specijalno formulisana đubriva za ishranu borovnice gajene na bankovima ili u saksijama. Borovnica, za razliku od većine drugih biljnih vrsta, u svojoj ishrani ima specifično veću potrebu za amonijačnim azotom (NH₄), u odnosu na nitratni (NO₃), stoga su ova đubriva formulisana na bazi povećanog sadržaja amonijačnog azota, a razlika u NPK formulaciji određena je vremenom primene. Fiziološka kiselost ovih đubriva je takođe prilagođena potrebi borovnice, i za razliku od drugih đubriva slične formulacije, kod Blueberry 1 i Blueberry 2 pH vrednost u 0.1% rastvoru je od 3 do 4,5. Blueberry 1 i Blueberry 2 predstavljaju osnovni izvor makroelemenata za celokupni vegetacioni period borovnice, a ostala đubriva na bazi sekundarnih elemenata i mikroelemenata se dodatno koriste.

- **Maksimalna rastvorljivost đubriva u vodi:** 200 g/kg



BLUEBERRY 1 20-5-10+ME

- Naglašen sadržaj azota pri čemu je odnos amonijačnog i nitratnog oblika 3:1
- Nizak sadržaj fosfora
- Primenjuje se kontinuirano, u prvom delu vegetacionog perioda borovnice, do faze precvetavanja
- Pogodna rezidualna kiselost đubriva za zasade borovnice

N: 20 %

N-NH₄: 15 %

N-NO₃: 5 %

P₂O₅: 5 %

K₂O: 10 %

+ME (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)



pH (0.1 %) 3-4.5

EC (0.1 %) 1.65

BLUEBERRY 2 10-5-25+3MgO

- Povećan sadržaj kalijuma.
- Odnos amonijačnog i nitratnog azota 3:1.
- Primenjuje se u drugom delu vegetacionog perioda, od precvetavanja pa sve do završetka berbe borovnice.
- Doprinosi kvalitetnijem nalivanju bobica i pigmentaciji, kao i povećanju sadržaja suve materije u plodovima.
- Pogodna rezidualna kiselost đubriva za zasade borovnice.

N: 10 %

N-NH₄: 7 %


N-NO₃: 3 %

P₂O₅: 5 %

K₂O: 25 %

MgO: 3 %

+ME (Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)



pH (0.1 %) 3-4.5

EC (0.1 %) 1.55

OPLEMENJIVAČI ZEMLJIŠTA I VODE

Humati i fulvati (osnovni sastojci humusa) su kompleksna jedinjenja, nastala mikrobiološkim razlaganjem prirodnih organskih materija biljnog porekla. Huminska i fulvinska kiselina, nisu nutrijenti, već materije koje pomažu asimilaciju osnovnih NPK elemenata, kao i ostalih hranljivih elemenata. Ove materije predstavljaju jedne od biohemijski najaktivnijih supstanci u prirodi. Deluju podjednako dobro primenjene preko korenovog sistema kao i preko lista. Humi i Fulvi proizvodi su organski oplemenjivači zemljišta, na bazi huminskih i fulvinskih kiselina, namenjeni za zemljišta sa dugom eksploatacijom i visokom mineralizacijom (plastenici, staklenici), kao i za peskovita i glinovita zemljišta.

Upotrebom ovih proizvoda direktno se povećava sadržaj humusnih materija u zemljištu, vrši se helatizacija mikroelemenata (čime oni postaju daleko usvojiviji), asimilacija fosfora, podstiče se aktivnost rada korenovog sistema, ubrzava sinteza hlorofila, ubrzava klijanje semena, vrši se helatizacija mikroelemenata u zemljištu, utiče se na propustljivost ćelijskih membrana, stimuliše se razvoj korisnih mikroorganizama, poboljšava se i stimuliše otpornost biljaka na patogene organizme. Jako je bitno navedene proizvode primeniti pre kritičnih faza u biljnoj proizvodnji, kao što su: presađivanje i različiti uslovi stresa (niske ili visoke temperature, oštećenja, pesticidni tretmani i dr.)



HUMIFLEX 20

- Tečno đubrivo na bazi huminskih kiselina
- Koristi se u početnom periodu vegetacije
- Primena: fertigaciono od 5 l/ha do 20 l/ha



- Ekstrakt humusa: 20 %
- Huminske kiseline: 15 %
- Fulvinske kiseline: 5 %
- Vodorastvorni K₂O: 1.5 %

- 1L 5L 10L
- pH (0.1 %) 8.3
- EC (0.1 %) 0.1

FULVIMAX 80

- Vodorastvorni prah sa visokim sadržajem fulvinskih kiselina
- Utiče na pojačanu mobilizaciju i usvajanje fosfora
- Idealan za primenu na početku vegetacionog perioda (s proleća)
- Primena: fertigaciono od 3 do 5 kg/ha



- Ekstrakt humusa: 80 %
- Huminske kiseline: 10 %
- Fulvinske kiseline: 70 %

- 1kg 8kg
- pH (0.1 %) 7.9
- EC (0.1 %) 0.25

FULVOVIT

- Tečno đubrivo sa slobodnim aminokiselinama za oporavak i fulvo kiselina za intenzivan porast biljaka
- Sadrži 8% slobodnih aminokiselina uz dodatak organskog i ukupnog azota
- Posebno se preporučuje nakon delovanja stresnih uslova (grad, mraz, visoke i niske temperature, suša, pojava bolesti i štetočina)
- Podstiče brži oporavak biljaka, intenzivan porast i fiziološku stabilnost
- Primena: folijarno: 1–2 l/ha (koncentracija do 0,5%), fertigaciono 2–5 l/ha



- Fulvo kiselina: 25 %
- Slobodne AK: 8 %
- Ukupni azot: 2 %
- Organski azot: 2 %

- 1L
- pH (0.1 %) 8.18
- EC (0.1 %) 0.86

pH GREEN

- Proizvod na bazi organskih kiselina
- Namenjen za primenu u uslovima visoke alkalnosti zemljišta i zalivnih voda (pH preko 7)
- Snižava pH vrednost tvrdih zalivnih voda, uz blago snižavanje EC vrednosti istih
- Kontinuiranom primenom u fertigaciji postepeno snižava pH vrednost zemljišta i povećava dostupnost hraniva
- Primenjuje se samostalno ili u kombinaciji sa fertigacionim đubrivima
- Primena: od 100 do 500 grama na 1000 l vode (u zavisnosti od pH vrednosti vode)



- N: 2.5 %
- Org. C: >20 %
- C/N: <15 %

- 1kg 8kg
- pH (0.1 %) 2.90
- EC (0.1 %) 0.60

Sa ponosom predstavljamo najefikasniju liniju proizvoda za ishranu bilja, ENERGY. Ova linija proizvoda je premium brend u okviru brenda FITOFERT, namenjen pre svega profesionalnim proizvođačima povrća, voća i cveća.

Osnovne karakteristike i prednosti ovih proizvoda su sledeće:

- Prisustvo organskih aktivatora fizioloških procesa AFP – formula
- Visoka koncentracija uz naglašeniju proporciju dominantnih aktivnih materija
- Izuzetna rastvorljivost i pH, EC izbalansiranost
- Održavanje sistema za navodnjavanje funkcionalnim
- Visoka efikasnost upotrebljenih hraniva i deblokada najvažnijih elemenata ishrane bilja

Moćna AFP formula, deo je svake ENERGY formulacije, a u pitanju je organski aktivator, zadužen za pokretanje mnogobrojnih enzimskih procesa u ćelijama biljaka. Zahvaljujući AFP formuli, ovi proizvodi ubrzavaju metabolizam, enzimske procese, tolerantnost prema stresnim uslovima i utiču na bolje usvajanje đubriva. Primenom ENERGY đubriva postižu se mnogobrojni pozitivni efekti na gajene biljke, ali se vodi računa i o samom zemljištu.

- **Maksimalna rastvorljivost đubriva u vodi:** 150 g/kg





ROOT 8-55-10

- Visok sadržaj lako usvojivog fosfora
- Izuzetna rastvorljivost đubriva
- Namenjeno pre svega za formiranje i razvoj korenovog sistema
- Bržim i efikasnijim usvajanjem fosfora u početnim fazama, bitno se utiče na pravilnu deobu i diferencijaciju ćelija kod biljaka, čime se obezbeđuje i visok prinos
- Inicira razvoj generativnih organa biljaka

N: 8 %

NH₄: 5 %

P₂O₅: 55 %

K₂O: 10 %

+ME (Fe(DTPA), Zn(DTPA), Mn(DTPA), Cu(DTPA), B, Mo)

pH (0.1 %) 5.30

EC (0.1 %) 0.87



BALANCE 20-10-20+3MgO

- Izbalansiran odnos azota i kalijuma, uz smanjen sadržaj fosfora
- Podjednako dobro utiče na vegetativni porast, formiranje plodova i naličanje plodova
- Najčešće se koristi kod slabije razvijene vegetativne mase i u stresnim uslovima

N: 20 %

NO₃: 5 %

NH₄: 2 %

NH₂: 13 %

P₂O₅: 10 %

K₂O: 20 %

MgO: 3 %

+ME (Fe(DTPA), Zn(EDTA), Mn(EDTA), Cu(EDTA), B, Mo)

pH (0.1 %) 5.40

EC (0.1 %) 0.52



COMPLETE A 14-7-15+14CaO+ME

- Jedinstvena formulacija sa idealnim odnosom azota (N), kalijuma (K), i kalcijuma (Ca)
- Koristi se tokom celog vegetacionog perioda.
- Bez sadržaja sulfata
- Pozitivno utiče na razvoj svih organa biljaka
- Povećava otpornost gajenih biljaka
- Pospešuje dobijanje kvalitetnijih i transportabilnijih plodova

N: 14 %

NO₃: 14 %

P₂O₅: 7 %

K₂O: 15 %

CaO: 14 %

+ME (Cu(EDTA), Fe(EDTA), Mn(EDTA), Zn(EDTA), Mo)

pH (0.1 %) 3-4.5

EC (0.1 %) 1.12



COMPLETE 10-5-20+CaO+2MgO+ME

- NPK formulacija sa dodatnim kalcijumom i magnezijumom
- Namenjen za korišćenje u drugom delu vegetacionog perioda, od početka pigmentacije plodova do berbe
- Pospešuje dobijanje kvalitetnijih i transportabilnijih plodova

N: 10 %

NO₃: 10 %

P₂O₅: 5 %

K₂O: 20 %

CaO: 8 %

MgO: 2 %

+ME (B, Cu(EDTA), Fe(DTPA), Mn(EDTA), Zn(EDTA), Mo)

pH (0.1 %) 3-4.5

EC (0.1 %) 1.05





OPTIMUS 17-7-27+4CaO+ME

- Izbalansiran odnos azota i kalijuma, uz smanjen sadržaj fosfora
- Podjednako dobro utiče na vegetativni porast, formiranje plodova i naliivanje plodova
- Najčešće se koristi kod slabije razvijene vegetativne mase i u stresnim uslovima

N: 17 %

N-NH₄: 10 %

N-NH₂: 7 %

P₂O₅: 7 %

K₂O: 27 %

CaO: 4 %

+ME (Fe(DTPA), Zn(EDTA), Mn(EDTA), Cu(EDTA), B, Mo)



pH (0.1 %) 7

EC (0.1 %) 1.15



ACTIVE 15-5-33+2MgO

- Visok sadržaj lako usvojivog kalijuma
- Posедује biostimulativnu ulogu koja dodatno podstiče razvoj biljaka
- Koristi se u većem delu vegetacionog perioda
- Obezbeđuje ranostasnost
- Produžava period eksploatacije biljaka

N: 15 %

NO₃: 9.5 %

NH₄: 1 %

NH₂: 4.5 %

P₂O₅: 5 %

K₂O: 33 %

MgO: 2 %

+ME (Fe(DTPA), Zn(EDTA), Mn(EDTA), Cu(EDTA), B, Mo)



pH (0.1 %) 5.58

EC (0.1 %) 1.24



Granulisano mikrobiološko đubrivo na bazi konzorcijuma komplementarnih bakterija, nanešenih na granulu organskog sastava.

Primena:Namenjen je za direktnu primenu u zoni korena pre ili za vreme sadnje, inkorporacijom u zemljište i/ili putem depozitora.

DEPOZITOROM U TRAKE			DEPOZITOROM U REDOVE			PO CELOJ PLOVIŠINI			PO CELOJ PLOVIŠINI		
	POVRĆE I VOĆE	100-200 kg/ha		RATARSKI USEVI	30-50 kg/ha		RATARSKI USEVI	100-200 kg/ha		ZASADI CVEĆA	3-5 g/m²

FITOBIOTIC GROUND sastoji se od organskih granula na koje su nanešeni mikroorganizmi iz roda *Bacillus spp.* (*B. pumilus* i *B. megaterium*) kao i stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla-giberline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije koje doprinose:



Prirodnoj aktivaciji mikrobiologije zemljišta




Ujedačenom nicanju i brzom startu biljaka





Boljem usvajanju fosfora i razvoju jačeg korena



Jačoj otpornosti na stresne uslove



Zahvaljujući organskoj granuli kao nosaču, obezbeđuje se dovoljno hrane mikroorganizmima za sam početak njihovih aktivnosti i istovremeno obogaćuje zemljište hranivima.



PROBIOTIK - PREBIOTIK TEHNOLOGIJA

formulacija koja sadrži mikroorganizme kao i hranu za mikroorganizme.



OSMOPROTEKTANT TEHNOLOGIJA

polimerna zaštita mikroorganizama, za dug rok trajanja

FITOBIOTIC TRIO na bazi algi i tri različita mikroorganizma iz roda *Bacillus spp.* (*B. velezensis*, *B. mojavensis*, *B. megaterium*) koji zajednički doprinose:



Bržoj regeneraciji biljaka nakon stresa



Jačem korenovom sistemu i boljoj vitalnosti biljaka




Boljoj iskoristivosti postojećeg hraniva iz zemljišta



Većoj aktivaciji sopstvenih hormona rasta



Boljoj otpornosti na bolesti i sušu



Tečno mikrobiološko đubrivo na bazi algi i konzorcijuma bakterija, koje svojim dejstvom grade idealnu sredinu za rast i razvoj biljaka.

Folijarno (preko lista):			FERTIGATION USAGE		
	3 - 5 l/ha			5 l/ha	



Poljoprivredna proizvodnja sve češće se suočava sa stresnim uslovima proizvodnje – sušom, visokim temperaturama i naglim vremenskim promenama. U takvim godinama prinos se ne gubi u žetvi, već u kritičnim fazama razvoja biljke, kada i kratkotrajan stres može imati trajne posledice.


SPEED tehnologija zasnovana je na pravovremenoj primeni, kako bi se biljka fiziološki pripremila za nepovoljne uslove, očuvala potencijal prinosa i stabilno prošla kroz najosetljivije faze razvoja. Ova brošura predstavlja praktičan vodič kroz ključne fenofaze najvažnijih ratarskih kultura i daje jasne preporuke za primenu **SPEED** proizvoda u momentima kada oni imaju najveći efekat.




SPEED TEHNOLOGIJA

STIMULATIVNA FORMULA VISOKIH PRINOSA

U sadašnjosti gde nepredvidive klimatske promene prete našem zemljištu i našim usevima, Triple Action tehnologija predstavlja revolucionarni odgovor na izazove i naš je saveznik u očuvanju poljoprivrednog ekosistema, štiteći zemljište, biljke i našu budućnost.



EFEKTI PRIMENE SPEED for PLANT PROIZVODA



for GRAIN

- SPEED for GRAIN je folijarno đubrivo formulisano na bazi biostimulativnih komponenata u kombinaciji sa helatnim mikroelementima (Cu, Zn, Mn);
- Stimuliše rast, razvoj i aktivnost korenovog sistema;
- Intenzivira metabolizam i usvajanja nutrijenata, tokom ranih faza rasta i niže temperature tla;
- Redukuje abiotički stres, izazvan hladnim vremenom, vrućinom i sušom;
- Povećava otpornost žitarica od patogena;
- Žitarice usvajaju mnogo veću količinu hraniva iz zemljišta zbog dobro stimulisanog korenovog sistema.
- Primena: folijarno 2-3l/ha.

N (Organski): 2 %

N ukupni: 5 %

N-NH₄: 3 %

K₂O: 2 %

Organski C: >4 %

SO₃: 10 %

Zn (EDTA): 0.3%

Mn (EDTA): 0.3 %

Cu (EDTA): 1 %



pH (0.1 %) 7.8
EC (0.1 %) 0.2

EXTRAN

- SPEED ExtraN je folijarno đubrivo sa visokom koncentracijom raspoloživog azota sa produženim vremenom usvajanja. Bezbedno i dugotrajno hrani useve, i do nekoliko nedelja nakon primene.
- Ovaj dugoročni efekat ishrane, pozitivno deluje na prinos, veličinu zrna žitarica, hektolitarsku masu i sadržaj proteina.
- Sinergija Azota, Magnezijuma, Sumpora i Biostimulatora u đubrivu dovodi do pojačane sinteze proteina u zrnu žitarica.
- Redukuje abiotički stres, izazvan hladnim vremenom, vrućinom i sušom;
- Sinergijski efekat primenjenih đubriva SPEED for SEED + SPEED for GRAIN + SPEED ExtraN rezultira boljom kondicijom useva i uvećanjem mikrobiološke aktivnosti, uslovljava usvajanje veće količine hraniva iz zemljišta, poboljšanjem kvaliteta zrna (povećanjem hektolitarske mase i sadržaja proteina).
- Primena: folijarno 3-5l/ha.

Ukupni azot (N): 24 %

Amidni (N-NH₂): Min. 16 %

Azot iz urea formaldehida: 8 %

MgO: 2 %

SO₃: 5 %

Ostali ME: 0.01 - 0.03%



pH (0.1 %) 8
EC (0.1 %) 0.24



for CORN

- SPEED for CORN je folijarno đubrivo, za useve kukuruza, formulisano na bazi biostimulativnih komponenata, u kombinaciji sa mikroelementarnim cinkom u obliku organskog kompleksa.
- Stimuliše rast, razvoj i aktivnost korenovog sistema;
- Intenzivira metabolizam i usvajanje nutrijenata, tokom ranih faza rasta i niže temperature tla;
- Redukuje abiotički stres, izazvan hladnim vremenom, vrućinom i sušom;
- Uvećava prinos i kvalitet zrna kukuruza (sadržaj proteina, hektolitarska masa).
- U tehnologiji uzgoja kukuruza, SPEED for CORN je đubrivo kojim se postiže prava sinergija, ukoliko su seme kukuruza i zemljište prethodno tretirani đubrivima SPEED for SEED i SPEED for SOIL.
- Primena: folijarno 2-3l/ha.

N ukupni: 5 %

SO₃: 10 %

N(Organski): 2 %

Zn: 1.5 %

N-NH₄: 3 %

K₂O: 2 %

Organski C: >4 %

Mn: 0,3 %

pH (0.1 %) 7,8

EC (0.1 %) 0.25



for SOYASUN

- SPEED for SOYASUN je folijarno đubrivo za useve soje i suncokreta;
- Stimuliše rast, razvoj i aktivnost korenovog sistema;
- Intenzivira metabolizam i usvajanje nutrijenata;
- Sadrži značajnu količinu sumpora (SO₃) koji znatno utiče na sintezu ulja i hlorofila, uz dodatak biostimulativnih komponenti i mikroelemenata (Zn, Mn, Mo);
- Redukuje abiotički stres, izazvan hladnim vremenom, vrućinom i sušom;
- Sinergijski efekat primenjenih đubriva SPEED for SEED + SPEED for SOYASUN + FITOFERT BORMAX 20 + SPEED for SOIL rezultira boljom kondicijom zemljišta i uvećanjem mikrobiološke aktivnosti, uvećanjem roda zrna, poboljšanjem kvaliteta zrna (povećanje sadržaja ulja).
- Primena: folijarno 2-3l/ha.

N ukupni: 5 %

SO₃: 10 %

N (Organski): 2 %

K₂O: 2 %

N-NH₄: 3 %

Mn (EDTA): 1 %

Organski C: >4 %

Zn (EDTA): 0.3 %

Mo: 0.5 %

pH (0.1 %) 8

EC (0.1 %) 0.2



for CANOLA

- SPEED for CANOLA je folijarno đubrivo za useve uljane repice koje sadrži visok sadržaj sumpora (50% SO₃) i znatno utiče na sintezu ulja i hlorofila, uz dodatak biostimulativnih komponenti i mikroelemenata (B, Mn).
- Stimuliše rast, razvoj i aktivnost korenovog sistema;
- Intenzivira metabolizam i usvajanje nutrijenata;
- Redukuje abiotički stres, izazvan hladnim vremenom, vrućinom i sušom;
- Sinergijski efekat primenjenih đubriva SPEED for CANOLA + FITOFERT BORMAX 20 (FITOFERT BORAMIN) u Cvetanju rezultira boljim Zametanjem Mahuna, većim brojem Zrna po mahuni kao i poboljšanjem Kvaliteta zrna (povećanje sadržaja ulja).
- Primena: folijarno 2-3l/ha.

N ukupni: 6 %

K₂O: 9 %

N-NH₄: 6 %

Mn (EDTA): 0.2 %

SO₃: 50 %

B: 0.2 %

pH (0.1 %) 7.7

EC (0.1 %) 1.13



BASE

- Intenzivira rast i razvoj korenovog sistema;
- Intenzivira početak vegetacije, tj. utiče na početak rasta nadzemnog dela biljaka;
- Namenjeno svim biljkama ali posebno ozimim i jarim usevima jer stimuliše rast korenovog sistema u uslovima hladnijeg vremena;
- Redukuje abiotički stres izazvan hladnim vremenom;
- Omogućava brže i bolje usvajanje hranljivih elemenata i povoljno utiče na povećanje prinosa i kvaliteta zrna.

SPEED for BASE se primenjuje folijarno u svim usevima, u početnim fazama rasta i rada korenovog sistema u količini od 1-2 kg/ha, uz utrošak 150 do 200 lit vode po hektaru.

Ukupni azot (N): 3 %

Organski ugljenik (C): 8 %

Organski azot (N): 3 %

Cu (EDTA): 0,3 %

P₂O₅: 30 %

Mn (EDTA): 1 %

K₂O: 20 %

Zn (EDTA): 2 %

pH (0.1 %) 6.45

EC (0.1 %) 1.83



ŠTA JE POTREBNO STRNIM ŽITIMA?

PŠENICA

Kritične tačke razvoja na koje se može uticati samo folijarnom prihranom:

1. Početak prolećne vegetacije (bokorenje i vlatanje)

U ovoj fazi pšenica ulazi u intenzivan porast, često opterećena hladnoćom i herbicidnim stresom. Metabolizam je usporen, a usvajanje hraniva ograničeno. Tokom vlatanja se definiše broj klasova i potencijal prinosa. To je momenat kada je biljkama neophodan prvi i pravovremeni folijarni tretman.

Preporuka: SPEED for GRAIN (2-3l/ha) primenjuje se kao prvi korak - aktivira metabolizam, smanjuje fitotoksiju i podržava ravnomeran razvoj i pripremu za generativnu fazu. Rezultat primene → veći broj klasića = viši prinos.

2. Pred klasanje i cvetanje

Najosetljivija faza pšenice. Stres u ovom periodu direktno utiče na broj dobro formiranih zrna i sadržaj proteina, odnosno u ovoj fazi se određuje kvalitet zrna. Ovaj period traje samo 10-14 dana i tada je neophodno adekvatno reagovati.

Preporuka: SPEED ExtraN (5-10 l/ha) obezbeđuje odmah dostupan i lako usvojiv azot za bolju oplodnju, stabilno nalivanje zrna i povećanje sadržaja proteina.

Čemu doprinosimo prihranom?

- veći broj zrna po klasu
- viši sadržaj proteina
- bolja hektolitarska masa


NAPOMENA: Jesenja primena **SPEED BASE** proizvoda doprinosi jačem razvoju korena i boljoj fiziološkoj pripremljenosti biljke za prezimljavanje.



1. Početak prolećne vegetacije (bokorenje i vlatanje)



2. Pred klasanje i cvetanje



JEČAM

Kritične tačke razvoja i preporuka za intervenciju **SPEED** đubrivima:

1. Izlazak iz zime (BBCH 25-29, pred intenzivan porast)

Ječam brzo reaguje na ishranu ali je osetljiv na preteran porast i poleganje, stoga je bitan kontrolisan start. Prekomeran azot dodatno pogoršava problem. Cilj su što jači temelj i stabljika, kako ne bi došlo do poleganja.


Preporuka: SPEED BASE (1kg/ha) se primenjuje kao osnovni proizvod za aktivaciju biljke, bolje ukorenjavanje i povećanje otpornosti na poleganje.

Šta postićemo primenom ovog proizvoda?

- jak koren
- otpornost biljaka na poleganje
- ujednačen porast



1. Izlazak iz zime



KOJE SU POTREBE **KUKURUZA**?

Kritične tačke razvoja na koje se može uticati samo folijarnom prihranom:

1. (3–6 listova) U ovoj fazi se formira potencijal klipa.

Preporuka: SPEED for CORN (2-3l/ha) Ključni faktor u najznačajnijim fenofazama organogeneze. Omogućava ranije metličenje i svilanje čime se smanjuje rizik od nepotpunih klipova.

Šta se postiže primenom?

- ujednačeno metličenje i svilanje
- dobro formiranje klipa
- stabilno nalivanje zrna



NAPOMENA: Primena proizvoda **SPEED for SOIL** zajedno sa pre-emergence herbicidima, uz primenu **SPEED BASE** kao preventivne ili korektivne mere u uslovima niskih temperatura i pojave žutila ili crvenila listova, doprinosi stabilizaciji fizioloških procesa, efikasnijem usvajanju hraniva i sigurnijem početnom razvoju kukuruza.



1. (3–6 listova)



ŠTA JE POTREBNO **SOJI I SUNCOKRETU**?

SOJA

Kritične tačke razvoja i preporuka za intervenciju **SPEED** i **FITOFERT** đubrivima:

1. Rani porast (2-3. troliska)

Biljke često ulaze u vegetaciju pod stresom, sa slabijim korenom i ograničenim usvajanjem hraniva.

Preporuka: SPEED for SOYASUN (2-3l/ha) stimuliše metabolizam i omogućava snažan i ujednačen porast.

2. Pred cvetanje

Najkritičnija faza za soju. Suša i visoke temperature dovode do opadanja cvetova i smanjenja prinosa.

Preporuka: SPEED for SOYASUN (2 l/ha) + FITOFERT BORMAX 20 (1 kg/ha) pospešuje grananje, produžava život cveta, podržava oprašivanje i formiranje mahuna.

Šta postizemo primenom ovih proizvoda?

- manje opadanja cvetova
- više mahuna i zrna
- stabilniji prinos u stresnim godinama



1. Rani porast (2-3. troliska)



2. Pred cvetanje



SUNCOKRET

Kritične tačke razvoja i preporuka za intervenciju **SPEED** i **FITOFERT** đubrivima:

1. Usporeno nicanje i stresni uslovi u periodu razvoja lisne mase

Jako otežano nicanje usled prisustva ptica i štetočina. Biljke često ulaze u vegetaciju pod stresom, sa slabijim korenom i ograničenim usvajanjem hraniva.

Preporuka: SPEED for SOYASUN (2-3l/ha) stimuliše metabolizam i omogućava snažan i ujednačen porast.


2. Formiranje glavice, cvetanje i formiranje zrna

Najkritičnija faza za suncokret. Suša i visoke temperature dovode do opadanja cvetova i smanjenja prinosa.

Preporuka: SPEED for SOYASUN (2 l/ha) + FITOFERT BORMAX 20 (1 kg/ha) kombinacija koja obezbeđuje ključne mikroelemente za optimalno cvetanje i oprašivanje, čime direktno utičemo na povećanje prinosa i kvalitet zrna.

Čemu doprinosi primena preporučenih proizvoda?

- veći broj zrna u glavi
- ujednačeno nalivanje zrna
- viši i stabilniji sadržaj ulja
- sigurniji prinos u uslovima suše i visokih temperatura



POTREBE **ULJANE REPICE** ZA RAST I RAZVOJ?

Kritične tačke razvoja i preporuka za intervenciju **SPEED** i **FITOFERT** đubrivima:

1. Priprema za zimu

Cilj je formiranje snažne rozete i povećanje otpornosti na niske temperature.

Preporuka: SPEED BASE (1 kg/ha) Jesenja primena jača koren, povećava koncentraciju ćelijskog soka i priprema biljku za prezimljavanje.

2. Prolećni porast

Preporuka: SPEED for CANOLA (2-3 l/ha) u kombinaciji sa pesticidima, za podršku ranom razvoju kada se i formira struktura prinosa.

3. Grananje i cvetanje

Preporuka: SPEED for CANOLA (2 l/ha) + FITOFERT BORMAX 20 (1 kg/ha) obezbeđuju sumpor i mikroelemente ključne za grananje, cvetanje i formiranje mahuna.

Šta postizemo prihranom? • snažan start posle zime • više grana i cvetova • veći broj mahuna i stabilan prinos



ŠTA JE NEOPHODNO ŠEĆERNOJ REPI?

Kritične tačke razvoja i preporuka za intervenciju FITOFERT đubrivima:

1. Od 4. do 8. lista

Preporuka: Humistart 2 l/ha + Aminoflex 25 l/ha sa poslednjim herbicidnim tretmanom protiv širokolisnih korova ili tretmanom protiv sarka.

2. Od 10. do 16. lista

Preporuka: Humisuper plus 1 l/ha + Bor-Amin 150 2 l/ha kraj maja do sredine juna meseca. Značajan uticaj na početak debljanja korena.

***Zemljišna primena: SQM Qrop K-plus 12-0-46** u fazi početka zadebljavanja korena tj. pred zatvaranje redova (pred špartanje) u količini od 100 do 150 kg/ha obezbeđuje intenzivnu sintezu šećera, veću masu korena i bolju digestiju.

3. U prvom tretmanu protiv Cercospore (druga polovina juna do polovine jula meseca)

Preporuka: Humisuper plus 1 l/ha + Bor-amin 150 2 l/ha Poboljšava transport šećera iz listova u koren, stabilizuje fiziološke procese biljke i ublažava negativne efekte toplotnog stresa.

4. U drugom ili trećem tretmanu protiv Cercospore (druga polovina jula do polovine avgusta meseca)

K-complex 2-3 l/ha Kontinuirana ishrana kalijumom pruža biljci stabilan rast i razvoj, utičući na povećanje prinosa i poboljšanje kvaliteta korena.

Šta postizemo? • stabilan metabolizam tokom letnjih stresnih uslova • efikasan transport i akumulacija šećera
• veća masa i bolja digestija korena • stabilni i visoki prinosi čak i u uslovima letnjeg toplotnog stresa



1. Od 4. do 8. lista



2. Od 10. do 16. lista



3. Tretman protiv Cercospore



EFEKTI PRIMENE SPEED for SOIL PROIZVODA



POSLEDICE SPALJIVANJA ŽETVENIH OSTATAKA

- Gubitak organske materije
- Uništavanje zemljišne mikroflore
- Nepotpuno sagorevanje biljnih ostataka
- Semena korova ne budu uništena u potpunosti
- Emisija CO₂, i loš uticaj na klimatske promen
- Ugrožavanja bezbednosti i zdravlja ljudi, opasnost od širenja požara.



POVEĆANJE SADRŽAJA ORGANSKE MATERIJE I HUMUSA

POBOLJŠANJE STRUKTURE ZEMLJIŠTA


- Vodno vazдушnih osobina
- Fizičkih osobina



POBOLJŠANJE MIKROBIOLOŠKE AKTIVNOSTI ZEMLJIŠTA I SADRŽAJA HRANLJIVIH ELEMENATA

- Odmah dostupna hrana
- Podsredstvom razgradnje

POVEĆANJE DRENIRANOSTI




for SOIL

- **SPEED for SOIL** je univerzalni proizvod i koristi se na svim tipovima zemljišta, a najbolje efekte daje na degradiranim zemljištima sa smanjenom mikrobiološkom aktivnošću. Permanentnom upotrebom, na žetvenim ostacima ili na zemljištu pre nicanja useva, postiže se bolja kondicija, aktivnost i fertilitet zemljišta.
- Razgrađuje i mineralizuje žetvene ostatke;
- Multiplicira aktivnost mikroorganizama u zemljištu;
- Balansira odnos korisnih i patogenih organizama;
- Popravlja strukturu zemljišta;
- Omogućava bolju usvojivost mineralnih materija iz zemljišta;
- **SPEED for SOIL** primenjen u pre-emergence fazi uz zemljišne herbicide podstiče mikrobiološku aktivnost i stabilnost rizosfere, smanjuje negativne efekte herbicidnog stresa na mlade biljke i obezbeđuje brži i ujednačeniji start useva.
- Standardna količina primene je od 2 do 4 litra po hektaru, a na degradiranim zemljištima koristiti veće doze, 4 lit/ha.



EFEKTI PRIMENE SPEED for SEED PROIZVODA



SPEED
for SEED

SPEED for SEED je grupa proizvoda, formulisana na bazi korisnih mikroorganizama, namenjenih za tretman semena ratarskih useva (pšenica, kukuruz, soja, suncokret)

Proizvodi su fomulisani u obliku suspenzije, zaštićeni odgovarajućim osmoprotektantima, kako bi se produžio rok trajanja samog proizvoda i što duži opstanak i aktivnost na tretiranom semenu.

Bakterije iz ovog preparata pospešuju rast i razvoj biljaka različitim mehanizama:

- povećavaju sadržaj hraniva u rizosferi
- biološkom fiksacijom azota vezuju azot iz vazduha i prevode ga u oblik koji biljka može da usvoji.
- nerastvorne oblike fosfora u zemljištu, čine lako usvojivim.
- produkuju polisaharide (šećere) koji značajno utiču na agregaciju zemljišta i veličinu makropora, povećavajući na taj način količinu dostupne vode i hraniva
- proizvode fitohormone, što ubrzava rast i razvoj biljke,
- smanjuju ili sprečavaju štetne efekte patogenih mikroorganizama putem sinteze antibiotika ili kompeticije za hranljive materije.

Razvijene formulacije inokulanata ili koinokulanata za tretman semena:
pšenice, kukuruza, soje, suncokreta.



FitoCrop | NPK 12:11:18

+2 % MgO+15 % S+0,01 % B+0,02 Zn+TE (SOP)



Zemljišno granulirano đubrivo.

Kompleksno mineralno đubrivo, specijalno formulisano da zadovolji sve nutritivne potrebe gajenih biljaka, pružajući optimalan balans makro i mikroelemenata, bez rizika od imobilizacije hraniva u zemljištu.

- Visokokvalitetna granula omogućava ravnomerno rasturanje po površini zemljišta, osiguravajući preciznu primenu po jedinici površine.
- Pored osnovnih makronutrijenata: azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K), obogaćeno je sekundarnim nutrijentima: magnezijumom (Mg) i sumporom (S), kao i mikroelementima: borom (B), cinkom (Zn), manganom (Mn) i gvožđem (Fe).
- Azot u amonijačnom obliku (NH_4^+) obezbeđuje postepeno usvajanje i smanjuje rizik od ispiranja.
- Fosfor u obliku polifosfata omogućava veću iskorišćenost bez nakupljanja u zemljištu.
- Kalijum u formi sulfata (SOP) poboljšava usvajanje, podstiče sintezu hormona i proteina.
- Ne sadrži hlor, čime se izbegava negativan uticaj na prinos i iskorišćenje hraniva.
- Aktivira se brzo uz minimalnu količinu vlage.
- Idealan za osnovnu i dopunsku ishranu tokom vegetacije.
- Višegodišnjom pravilnom primenom ne dolazi do nagomilavanja hraniva u zemljištu, što garantuje stabilan prinos.

FitoCrop | NPK+S 8-20-30 (3)

COMPLEX



Zemljišno granulirano đubrivo.

Kompleksno mineralno đubrivo sa povišenim sadržajem fosfora i kalijuma, namenjeno kulturama sa povećanim zahtevima za energijom, razvojem korena i formiranjem prinosa.

Idealno za ratarske useve, naročito za uljanu repicu i šećernu repu kao i za suncokret u redove tokom setve.

Visokokvalitetna granula omogućava ravnomerno rasturanje i preciznu primenu

- Visok sadržaj fosfora podstiče razvoj korena i bolji početni porast
- Povišen udeo kalijuma doprinosi formiranju i stabilnosti prinosa
- Sumpor poboljšava efikasnost ishrane i usvajanje hraniva
- Ne sadrži hlor
- Pogodno za osnovnu i dopunsku ishranu tokom vegetacije

Fertiplus® 4-3-3

Peletirano organsko đubrivo na bazi pilećeg stajnjaka koje sadrži 65% organske materije, čime značajno obogaćuje i oplemenjuje zemljište. Obogaćeno je huminskim i fulvinskim kiselinama čime doprinosi poboljšanju strukture zemljišta i povećava njegov potencijal plodnosti, pružajući optimalne uslove za rast i razvoj gajenih kultura.

Ključne karakteristike i prednosti:

- Povećanje mikrobiološke aktivnosti zemljišta
- Poboljšanje strukture zemljišta
- Dostupnost hranljivih materija u dužem vremenskom periodu
- Visoka efikasnost usvajanja elemenata od strane biljaka i smanjivanje njihovih gubitaka
- Povećanje dostupnih hranljivih materija
- Sadrži bitne hranjive elemente

Preporuke za primenu:

- Povrtarstvo: Primena 7–14 dana pre setve ili sadnje, uz obradu površinskog sloja zemljišta.
- Voćarstvo: Rana prolećna primena u višegodišnjim zasadima.
- Drvenaste biljne vrste: Rasturanje po površini zemljišta iznad korenove zone, uz obradu zemljišta za bolje inkorporisanje.

U slučaju nemogućnosti primene u preporučenim terminima, đubrivo se može primeniti kasnije, pred najavljene padavine ili aktivaciju sistema za navodnjavanje.

Fertiplus® 4-3-3 – Za plodnije zemljište, zdraviji biljni sistem i održivu poljoprivrednu proizvodnju.



Kekkilä Profesional

Visoko kvalitetni supstrat

Kekkilä Profesional je lider u proizvodnji visoko kvalitetnih supstrata. Moderan i kompjuterizovan način proizvodnje treseta osigurava visoko kvalitatan krajnji proizvod.

Glavna sirovina Kekkilä profesionalnih supstrata je prvoklasni beli ili braon Sphagnum treset. Treset je sa Finskog močvarnog tla i zahvaljujući Kekkilä proizvodnim metodama sadrži prirodne biološke aktivne agense. Treset se sastoji od 95% organskog materijala. Mešavina je raspadnutog biljnog materijala koji se nakupio u sredini zasićenoj vodom i bez kiseonika. Ovaj treset zbog toga većinom sadrži raspadnutu Sphagnum mahovinu.

Kao sastojak supstrata, treset je po pitanju učinka bolji od bilo kog drugog materijala. Zbog svoje sposobnosti da zadržava vodu i hranjive materije, štedi đubrivo i vodu. Zahvaljujući svojoj specijalnoj strukturi, omogućava dotok vazduha do korenja. Treset prirodno u sebi ne sadrži ljudske i biljne patogene, a sadrži korisne mikrobe koji pomažu i sprečavanju gljivičnih oboljenja. Huminska kiselina koja se prirodno javlja, stimuliše rast korenja. S obzirom da je to organski materijal, moguće ga je kompostirati i ne stvara neželjeni otpad.



**KEKKILÄ
SUPSTRATI**
Power by Finland



OZNAKA	pH	NAMENA	CRNI TRESET %	BELI TRESET %	NPK	NPK kg/m	STRUKTURA u mm	PAK. u lit
DSM 2W	6-6,5	SETVA POVRČA I CVEĆA	25	75	15-12-29	1	0-7 FF	70, 280

FF – fina frakcija
Karakteriše ih lako upijanje i
dobro zadržavanje vode i hranljivih materija

Preporuka pri setvi, pre pikiranja i pre sadnje:

Proplant 0,15% + Fosco 0,1%
(1-1.5l po kontejneru, ili 50ml po saksiji, zalivanjem)
Za zalivanje u međuvremenu FitoFert HumiStart 0.3% (folijarno 0.3-0.5%)

ISHRANA VOĆA

U intenzivnoj proizvodnji voća veoma je važna adekvatna primena đubriva, kako osnovnih (granulisanih), tako i dopunskih (fertigacionih i folijarnih). Osnovno đubrenje se obavlja u periodu jesen-zima i/ili zima-proleće, a pravi izbor formulacije, količine i vremena primene đubriva zavise od više faktora od kojih su najvažniji: osobine zemljišta, starost i izdašnost zasada, planirani prinos, itd. S obzirom na realne potrebe voćnih vrsta prema hranljivim elementima, univerzalna preporuka za osnovno đubrenje je izbor formulacije sa naglašenim sadržajem kalijuma. Sve je češća situacija da su zemljišta siromašna organskom materijom (humusom), tako da bi se, u nedostatku stajskog đubriva, preporuka bazirala na primeni peletiranih pilećih stajnjaka poput FertiPlus-a. Sa druge strane, dopunskom prihranom, bilo folijarnom bilo fertigacionom, moguće je u potpunosti zadovoljiti zahteve biljaka za hranivima u svakoj fenofazi rasta i razvika, kao i sprečiti pojavu deficita određenih makro, sekundarnih i/ili mikro elemenata.

Široka lepeza FITOFERT preparata omogućuje da na pravi način prihranite zasade adekvatnim đubrivom. Ono što izdvaja FITOFERT preparate od ostalih je to da mi ne nudimo jedno univerzalno sredstvo već širok spektar preparata, čijom se pravovremenom primenom postižu značajni pozitivni efekti.

Pozitivni efekti najčešće se ogledaju u jačanju i podizanju vitalnosti biljke, razvijanju otpornosti prema različitim oblicima stresa (temperaturni, pesticidni), podizanju prinosa i kvaliteta ploda. Takođe, prednosti primene FITOFERT proizvoda se ogledaju u povećanju transportabilnosti i veka trajanja ploda, kao i u eliminaciji bolesti nastalih usled fizioloških nedostataka.

Prihranu voća potrebno je obaviti u skladu sa trenutnim razvojem biljaka i njihovim potrebama za specifičnim nutrijentima. Savetujemo da folijarnu prihranu koristite združeno sa sredstvima za zaštitu bilja, pri čemu je jako bitno ispoštovati odgovarajuće fenofaze.



VINOVA LOZA

Predloženi fertigacioni program ishrane dat je na osnovu fenofaza razvoja. Ukoliko se tokom jedne fenofaze vrši više zalivnih tretmana, preporučenu količinu đubriva podeliti ravnomerno prema broju zalivnih tretmana.

U osnovnom đubrenju u redove uneti granulisano đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma, u količini od 250-350 kg/ha i to **FitoCrop Complex 12-11-18 ili 8-20-30+3S** Po potrebi dodati i peletirani pileći stajnjak **FertiPlus** u količini od 600 do 1000 kg/ha, takođe u skladu sa analizom zemljišta i opštim stanjem na terenu.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	LASTARI DUŽINE 10cm	PRED CVETANJE I CVETANJE	OD PRECVETAVANJA DO FORMIRANIH BOBICA	ZATVARANJE GROZDA	OD POČETKA ŠARKA DO PRED BERBU		POSLE BERBE (RANE SORTE)
	kg(l)/ha ENOVIT + BIOFLEX-L 1 + 2	kg(l)/ha BIOFLEX-L + BORMAX 20 2 + 1	kg(l)/ha HUMISTART + ENOVIT 2 + 1	kg(l)/ha MAGNI-CAL B + AMINOFLEX 25 2 + 2	kg(l)/ha CALCIUM ORGANO 30 + K-COMPLEX 20 2 + 3		kg(l)/ha ENOVIT 2
							
NPK + Mg+ME 	kg/ha po fenofazi ENERGY ROOT 8-55-10 iii START 10-45-10+ME 30 40	kg/ha po fenofazi ENERGY COMPLETE A 14-7-15+14CaO+ME 30-40	kg/ha po fenofazi ENERGY OPTIMUS NPK 17-7-27+4CaO+ME 30-40	Kg/ha po fenofazi BERRY 14-8-30+2MgO+ME 40	kg/ha po fenofazi FINALE 5-10-45+ME 30		
Ca				Ca-NIT	30		
							

JABUKA, KRUŠKA I DUNJA

Predloženi fertigacioni program ishrane dat je na osnovu fenofaza razvoja. Ukoliko se tokom jedne fenofaze vrši više zalivnih tretmana, preporučenu količinu đubriva podeliti ravnomerno prema broju zalivnih tretmana. Uosnovnom đubrenju u zoni redova primeniti granulirano đubrivo **FitoCrop Complex 12-11-18 ili 8-20-30+3S u količini od 250 do 600 kg/ha**, zavisno od rezultata analize zemljišta.



Po potrebi dodati i peletirani pileći stajnjak **FertiPlus u količini od 600 do 1000 kg/ha**, takođe u skladu sa analizom zemljišta i opštim stanjem na terenu.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	ZELENI BUKETIĆI	ROZE PUPOLJAK	CVETANJE	PRECVETAVANJE	PLOD VELIČINE LEŠNIKA	PLOD VELIČINE ORAHA	7-10 DANA KASNIJE
	COMBIVIT COMPLEX 14 + HUMISTART kg(l)/ha 2 + 3	BORMAX 20 + BIOFLEX-L kg(l)/ha 1 + 2	BIOFLEX-L kg(l)/ha 3	MAGNICAL-B + AMINOFLEX 25 kg(l)/ha 3-5 + 1-2	CAL-AMINO 15 + AMINOFLEX 25 ** PO POTREBI kg(l)/ha 5 + 1	CAL-AMINO 15 (2 TRETMANA) kg(l)/ha 5	HUMISTART kg(l)/ha 3-4
	NPK + Mg+ME kg/ha po fenofazi START 10-45-10+ME + FERRO CHELL 6 (ZA KRUŠKU) 30 + 5	KRISTAL 20-20-20+ME + FULVIMAX (za kisela zemljišta) kg/ha po fenofazi 30 + 5	BERRY 14-8-30+2MgO+ME kg/ha po fenofazi 30	BERRY 14-8-30+2MgO+ME kg/ha 30	BERRY 14-8-30+2MgO+ME kg/ha 40	SQM ULTRASOL K-PLUS 13-0-46 + MG SUL kg/ha po fenofazi 40 + 10	SQM ULTRASOL K-PLUS 13-0-46 + MG SUL kg/ha po fenofazi 30 + 20
Ca		SQM UltraSol Calcium 20	SQM UltraSol Calcium 25	SQM UltraSol Calcium 25	SQM UltraSol Calcium 30		
							

7-10 DANA KASNIJE	POČETAK BERBE	PUNA BERBA	POSLE BERBE
kg(l)/ha CAL-AMINO 15 5	kg(l)/ha CALCIUM ORGANO 30 + K-COMPLEX 20 2-3 + 4-5	kg(l)/ha K-COMPLEX 20 ** PO POTREBI 5	kg(l)/ha COMBIVIT COMPLEX 14 + HUMISTART 2 + 3
kg/ha po fenofazi SQM UltraSol K Plus + FINALE 5-10-45+ME 20 + 20	kg/ha po fenofazi FINALE 5-10-45+ME 40	kg/ha po fenofazi FINALE 5-10-45+ME 30	



BRESKVA,
ŠLJIVA I
NEKTARINA

Predloženi fertigacioni program ishrane dat je na osnovu fenofaza razvoja. Ukoliko se tokom jedne fenofaze vrši više zalivnih tretmana, preporučenu količinu đubriva podeliti ravnomerno prema broju zalivnih tretmana.

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i svim pratećim neophodnim elementima:
FitoCrop Complex 12-11-18 ili 8-20-30+3S 300-500 kg/ha + SQM Qrop K Plus 200-300 kg/ha.
U nedostatku organske materije u zemljištu, preporučljiva je primena peletiranog stajskog đubriva **Ferti Plus 4-3-4, u količini od 500 - 1000 kg/ha.**

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima.

Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju zalivnih tretmana.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	ROZE PUPOLJAK DO PUNOG CVETANJA	PRECVETAVANJE	PLOD VELIČINE LEŠNIKA	NA SVAKIH 7-10 DANA, DO POČETKA ZRENJA	POČETAK ZRENJA	POSLE BERBE																
	<table><tr><td>HUMISTART + COMBIVIT COMPLEX 14</td><td>kg(l)/ha 3 + 2</td></tr><tr><td>BIOFLEX-L + BORMAX-20</td><td>3 + 1</td></tr></table>	HUMISTART + COMBIVIT COMPLEX 14	kg(l)/ha 3 + 2	BIOFLEX-L + BORMAX-20	3 + 1	<table><tr><td>MAGNI-CAL B + AMINOFLEX 25</td><td>kg(l)/ha 3-5 + 2</td></tr></table>	MAGNI-CAL B + AMINOFLEX 25	kg(l)/ha 3-5 + 2	<table><tr><td>HUMISTART + MAGNI-CAL B</td><td>kg(l)/ha 3 + 2</td></tr></table>	HUMISTART + MAGNI-CAL B	kg(l)/ha 3 + 2	<table><tr><td>CAL-AMINO 15 + *AMINOFLEX 25 *PO POTREBI</td><td>kg(l)/ha 3-4 + 2</td></tr></table>	CAL-AMINO 15 + *AMINOFLEX 25 *PO POTREBI	kg(l)/ha 3-4 + 2	<table><tr><td>CALCIUM ORGANO 30 + K-COMPLEX 20</td><td>kg(l)/ha 1-2 + 3-4</td></tr></table>	CALCIUM ORGANO 30 + K-COMPLEX 20	kg(l)/ha 1-2 + 3-4	<table><tr><td>HUMISTART + COMBIVIT COMPLEX 14</td><td>kg(l)/ha 3 + 2</td></tr></table>	HUMISTART + COMBIVIT COMPLEX 14	kg(l)/ha 3 + 2		
HUMISTART + COMBIVIT COMPLEX 14	kg(l)/ha 3 + 2																					
BIOFLEX-L + BORMAX-20	3 + 1																					
MAGNI-CAL B + AMINOFLEX 25	kg(l)/ha 3-5 + 2																					
HUMISTART + MAGNI-CAL B	kg(l)/ha 3 + 2																					
CAL-AMINO 15 + *AMINOFLEX 25 *PO POTREBI	kg(l)/ha 3-4 + 2																					
CALCIUM ORGANO 30 + K-COMPLEX 20	kg(l)/ha 1-2 + 3-4																					
HUMISTART + COMBIVIT COMPLEX 14	kg(l)/ha 3 + 2																					
																						
<table><tr><td>NPK + Mg+ME</td><td>kg/ha po fenofazi</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	NPK + Mg+ME	kg/ha po fenofazi			<table><tr><td>ENERGY ROOT 8-55-10 ili START 10-45-10+ME</td><td>kg/ha po fenofazi 30 40</td></tr></table>	ENERGY ROOT 8-55-10 ili START 10-45-10+ME	kg/ha po fenofazi 30 40	<table><tr><td>ENERGY BALANCE 20-10-20+3MgO ili KRISTAL 20-20-20+ME</td><td>kg/ha po fenofazi 40 40</td></tr></table>	ENERGY BALANCE 20-10-20+3MgO ili KRISTAL 20-20-20+ME	kg/ha po fenofazi 40 40	<table><tr><td>ENERGY ACTIVE 15-5-33+2MgO ili BERRY 14-8-30+2MgO+ME</td><td>kg/ha po fenofazi 60 60</td></tr></table>	ENERGY ACTIVE 15-5-33+2MgO ili BERRY 14-8-30+2MgO+ME	kg/ha po fenofazi 60 60	<table><tr><td>BERRY 14-8-30+2MgO+ME HUMIFLEX 20 (PRIMENITI ODVOJENO)</td><td>kg/ha po fenofazi 50 10</td></tr></table>	BERRY 14-8-30+2MgO+ME HUMIFLEX 20 (PRIMENITI ODVOJENO)	kg/ha po fenofazi 50 10	<table><tr><td>FINALE 5-10-45+ME</td><td>kg/ha po fenofazi 40</td></tr></table>	FINALE 5-10-45+ME	kg/ha po fenofazi 40	<table><tr><td>FINALE 5-10-45+ME</td><td>kg/ha po fenofazi 30</td></tr></table>	FINALE 5-10-45+ME	kg/ha po fenofazi 30
NPK + Mg+ME	kg/ha po fenofazi																					
																						
ENERGY ROOT 8-55-10 ili START 10-45-10+ME	kg/ha po fenofazi 30 40																					
ENERGY BALANCE 20-10-20+3MgO ili KRISTAL 20-20-20+ME	kg/ha po fenofazi 40 40																					
ENERGY ACTIVE 15-5-33+2MgO ili BERRY 14-8-30+2MgO+ME	kg/ha po fenofazi 60 60																					
BERRY 14-8-30+2MgO+ME HUMIFLEX 20 (PRIMENITI ODVOJENO)	kg/ha po fenofazi 50 10																					
FINALE 5-10-45+ME	kg/ha po fenofazi 40																					
FINALE 5-10-45+ME	kg/ha po fenofazi 30																					
Ca		<table><tr><td>SQM UltraSol Calcium</td><td>30</td></tr></table>	SQM UltraSol Calcium	30	<table><tr><td>SQM UltraSol Calcium</td><td>40</td></tr></table>	SQM UltraSol Calcium	40	<table><tr><td>SQM UltraSol Calcium</td><td>30</td></tr></table>	SQM UltraSol Calcium	30												
SQM UltraSol Calcium	30																					
SQM UltraSol Calcium	40																					
SQM UltraSol Calcium	30																					
																						

TREŠNJA I VIŠNJA

Predloženi fertigacioni program ishrane dat je na osnovu fenofaza razvoja. Ukoliko se tokom jedne fenofaze vrši više zalivnih tretmana, preporučenu količinu đubriva podeliti ravnomerno prema broju zalivnih tretmana.

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i svim pratećim neophodnim elementima:
FitoCrop Complex 12-11-18 ili 8-20-30+3S 300-500 kg/ha + SQM Qrop K PLUS 200-300 kg/ha.
U nedostatku organske materije u zemljištu, preporučljiva je primena peletiranog stajskog đubriva **Ferti Plus 4-3-4, u količini od 500 - 1000 kg/ha.**

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima.

Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju zalivnih tretmana



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	BELE KOKICE DO PRECVETAVANJA	FORMIRANJE PLODA (ZRNO GRAŠKA)	7 DO 10 DANA KASNIJE	PIGMENTACIJA	7 DO 10 DANA KASNIJE	POSLE BERBE
	HUMISTART + BIOFLEX-L 2 + 2 kg(l)/ha	MAGNI-CAL B + COMBIVIT COMPLEX 14 3 + 2 kg(l)/ha	MAGNI-CAL B + AMINOFLEX 3 + 2 kg(l)/ha	BIOFLEX-L + K-COMPLEX 20 2-3 + 3 kg(l)/ha	CALCIUM ORGANO 30 + K-COMPLEX 20 2-3 + 3 kg(l)/ha	HUMISTART + COMBIVIT COMPLEX 14 3 + 2 kg(l)/ha
						
NPK + Mg+ME  Ca	kg/ha po fenofazi ENERGY ROOT 8-55-10 30 ili START 10-45-10+ME 40	kg/ha po fenofazi ENERGY BALANCE 20-10-20+3MgO 40 ili KRISTAL 20-20-20+ME 40 SQM UltraSol Calcium 40	kg/ha po fenofazi BERRY 14-8-30+2MgO+ME 80 HUMIFLEX (PRIMENITI ODVOJENO) 20 SQM UltraSol Calcium 30	kg/ha po fenofazi ENERGY ACTIVE 15-5-33+2MgO 70 ili BERRY 14-8-30+2MgO+ME 80	kg/ha po fenofazi FINALE 5-10-45+ME 60	kg/ha po fenofazi ENERGY COMPLETE 10-5-20+CaO+2MgO+ME 30
						

MALINA I KUPINA

Predloženi fertigacioni program ishrane dat je na osnovu fenofaza razvoja. Ukoliko se tokom jedne fenofaze vrši više zalivnih tretmana, preporučenu količinu đubriva podeliti ravnomerno prema broju zalivnih tretmana.

U osnovnom đubrenju u redove uneti **FitoCrop Complex 12-11-18 ili 8-20-30+3S** granulisano đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma, u količini od 450 do 500 kg/ha, u skladu sa analizom zemljišta. Po potrebi dodati i peletirani pileći stajnjak **FertiPlus** u količini od 600 do 1000 kg/ha, takođe u skladu sa analizom zemljišta i opštim stanjem na terenu.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	UKORENJAVANJE		INTENZIVAN PORAST		POČETAK CVETANJA		PUNO CVETANJE		PRE BERBE		POČETAK BERBE I PLODONOŠENJE		POSLE BERBE	
	Koncentracija - %		Koncentracija - %		Koncentracija - %		Koncentracija - %		Koncentracija - %		Koncentracija - %		Koncentracija - %	
	BIOFLEX-L + HUMISTART	0.25 + 0.25	HUMISUPER PLUS + BIOFLEX-L	0.30 + 0.25	BIOFLEX-L + BORMAX 20	0.25 + 0.1	HUMISTART + COMBIVIT COMPLEX 14	0.3 + 0.2	HUMISUPER PLUS + MAGNI-CAL B	0.3 + 0.3	K-COMPLEX 20 + CALCIUM ORGANO 30	0.25 + 0.3	HUMISTART + BIOFLEX-L	0.25 + 0.30
														
NPK + Mg+ME 	kg(l)/ha nedeljno		kg(l)/ha nedeljno		kg(l)/ha nedeljno		kg(l)/ha nedeljno		kg(l)/ha nedeljno		kg(l)/ha nedeljno		kg(l)/ha nedeljno	
	KRISTAL START 10-45-10+ME + HUMISTART	30 + 10	NITRO 25-5-10 + HUMISUPER PLUS	40 + 10	ENERGY BALANCE 20-10-20+3MgO	40	KRISTAL 20-20-20+ME	40	ENERGY COMPLETE 10-5-20+CaO+2MgO+ME- HUMISUPER PLUS (PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM)	40 10	BERRY 14-8-30+2MgO+ME	30	KRISTAL 20-20-20+ME + HUMISTART	20 + 5
Ca			SQM UltraSol Calcium	20	SQM UltraSol Calcium	30	SQM UltraSol Calcium	30	SQM UltraSol Calcium	30				
														

JAGODA

Predloženi fertigacioni program ishrane dat je na osnovu fenofaza razvoja. Ukoliko se tokom jedne fenofaze vrši više zalivnih tretmana, preporučenu količinu đubriva podeliti ravnomerno prema broju zalivnih tretmana.


U osnovnom đubrenju u redove uneti granulisano đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma u količini od 250 do 350 kg/ha i to **FitoCrop Complex 12-11-18 ili 8-20-30+3S**. Količine moguće menjati u skladu sa analizom zemljišta. Po potrebi dodati i peletirani pileći stajnjak **FertiPlus** u količini od 600 do 1000 kg/ha, takođe u skladu sa analizom zemljišta i opštim stanjem na terenu.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	PRE POČETKA VEGETACIJE	UKORENJAVANJE	INTENZIVAN PORAST I POČETAK CVETANJA	PUNO CVETANJE	NALIVANJE PLODOVA	PIGMENTACIJA PLODOVA	POSLE BERBE
		Koncentracija - % HUMISTART + BIOFLEX-L 0.25 + 0.25	Koncentracija - % BIOFLEX-L + COMBIVIT COMPLEX 14 0.25 + 0.2	Koncentracija - % BIOFLEX-L + BORMAX 20 0.25 + 0.1-0.2	Koncentracija - % MAGNI-CAL B + AMINOFLEX 25 0.3 + 0.2	Koncentracija - % K-COMPLEX 20 + CALCIUM ORGANO 30 0.3 + 0.2	Koncentracija - % HUMISTART + COMBIVIT COMPLEX 14 0.25 + 0.20
							
NPK + Mg+ME 	kg(l)/ha nedeljno ENERGY ROOT 8-55-10 ili START 10-45-10+ME + HUMISTART 30 40 + 10	kg(l)/ha nedeljno ENERGY ROOT 8-55-10 ili START 10-45-10+ME 30 40	kg(l)/ha nedeljno KRISTAL 20-20-20+ME ili ENERGY BALANCE 20-10-20+3MgO 30 30	kg(l)/ha nedeljno ENERGY COMPLETE 10-5-20+CaO+2MgO+ME 40	kg(l)/ha nedeljno BERRY 14-8-30+2MgO+ME ili ENERGY COMPLETE A 14-7-15-CaO+ME 40 25	kg(l)/ha nedeljno BERRY 14-8-30+2MgO+ME ili ENERGY OPTIMUS 17-7-27+4CaO+ME 30-40 30-40	kg(l)/ha nedeljno KRISTAL 20-20-20+ME 20
Ca		SQM UltraSol Calcium 20	SQM UltraSol Calcium 25	SQM UltraSol Calcium 25	SQM UltraSol Calcium 20		
							

BORO-
VNICA,
ARONIJA
I RIBIZLA

Pre početka vegetacije, primeniti osnovno granulirano đubrivo **FitoCrop Complex 12-11-18 ili 8-20-30+3S**, u količini od 50 do 100 g/biljci, uz dodatak peletiranog stajnjaka FertiPlus od 100 do 150 g/biljci. U slučaju proizvodnje borovnice u saksijama, isključuje se primena ovih, osnovnih zemljišnih đubriva.

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima. Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju tretmana. Pre svake upotrebe proizvoda **pH GREEN** izvršiti kontrolu pH zemljišta, i na osnovu rezultata korigovati količinu ovog proizvoda.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	PRE POČETKA VEGETACIJE	POČETAK LISTANJA	INTENZIVAN PORAST	PUNO CVETANJE	NALIVANJE PLODOVA	PIGMENTACIJA PLODOVA	POSLE BERBE
		Koncentracija - % BIOFLEX-L + HUMISTART 0.25 + 0.25	Koncentracija - % BORMAX 20 + BIOFLEX-L 0.1-0.2 + 0.25	Koncentracija - % HUMISTART + COMBIVIT COMPLEX 14 + BIOFLEX-L 0.25 + 0.2 + 0.2	Koncentracija - % MAGNICAL-B 0.4-0.5	Koncentracija - % K-COMPLEX 20 + CALCIUM ORGANO 30 0.25 + 0.3	Koncentracija - % HUMISTART + COMBIVIT COMPLEX 14 0.35 + 0.20
							
NPK + Mg+ME 	kg(l)/ha nedeljno START 10-45-10+ME + HUMISTART 30 + 20	kg(l)/ha nedeljno HUMISTART + FULVIMAX 80 (PRIMENITI ODVOJENO) 20 5	kg(l)/ha nedeljno BLUEBERRY 1 20-5-10+ME + pH GREEN 35 + 5	kg(l)/ha nedeljno BLUEBERRY 1 20-5-10+ME + pH GREEN 35 + 5	kg(l)/ha nedeljno BLUEBERRY 2 10-5-25+MgO + FULVIMAX 80 (PRIMENITI ODVOJENO) 25 5	kg(l)/ha nedeljno FINALE 5-10-45+ME + BLUEBERRY 2 10-5-20+ME 20 + 10	kg(l)/ha nedeljno KRISTAL 20-20-20+ME + pH GREEN 20 + 5
Ca			SQM UltraSol Calcium	SQM UltraSol Calcium	SQM UltraSol Calcium		
							

LESKA U RODU

Pre početka vegetacije, primeniti osnovno granulirano đubrivo **FitoCrop Complex 12-11-18 ili 8-20-30+3S**, u količini od 400 do 500 kg/ha, uz dodatak peletiranog stajnjaka **FertiPlus od 400 do 800 kg/ha** (Količine se koriguju u zavisnosti od analize zemljišta).

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po fenofazi. Ukoliko se zasad tretira više puta u toku fenofaza, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju tretmana. Pre svake upotrebe proizvoda **pH GREEN** izvršiti kontrolu pH vode i zemljišta, i na osnovu rezultata korigovati količinu ovog proizvoda.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	CVETANJE	OLISTAVANJE	INTENZIVAN PORAST	NALIVANJE PLODA	PRED BERBU	POSLE BERBE	ZEMLJIŠNO OSNOVNO ĐUBRENJE
	Koncentracija - % BORMAX 20 + BIOFLEX-L 0.2 + 0.25	Koncentracija - % HUMISTART + COMBIVIT COMPLEX 14 0.3 + 0.2	Koncentracija - % MAGNICAL-B + AMINOFLEX 25 0.3 + 0.2	Koncentracija - % HUMISUPER PLUS + AMINOFLEX 25 0.4 + 0.2	Koncentracija - % K-COMPLEX 20 + CALCIUM ORGANO 30 0.4 + 0.3	Koncentracija - % HUMISTART + COMBIVIT COMPLEX 14 0.3 + 0.2	
							
NPK + Mg+ME							
							
Ca							
							

*Putem fertigacije uz djubriva dodavati pH green za bazna zemljišta i vode sa jakim EC-om.

ISHRANA POVRĆA

Svaka povrtarska biljka tokom svog porasta i razvića, u zavisnosti od fenofaze u kojoj se nalazi, ima određene potrebe za hranljivim makroelementima (N, P, K), sekundarnim elementima (Ca, Mg, S) i mikroelementima (Fe, B, Cu, Mn). Te količine ne mogu se kod povrtarskih kultura obezbediti u potpunosti prilikom osnovnog đubrenja zemljišta, već bi ih trebalo dodavati i u toku vegetacije, fertigacijom i folijarnom ishranom.

FITOFERT đubriva su u potpunosti usklađena sa odgovarajućim fenofazama razvića povrća. Kristalne vodotopive formulacije se koriste za fertigacionu prihranu. U folijarnim aplikacijama se koriste proizvodi na bazi sekundarnih i mikroelemenata, kao i biostimulativna i imunostimulativna sredstva za ishranu biljaka. U nastavku su date preporuke naše Stručne službe za uzgoj različitih vrsta povrća.

Proizvodnja rasada - za većinu povrtarskih kultura vreme proizvodnje rasada kreće se od 4 do 8 nedelja, i u tom vremenskom periodu biljka ima male potrebe za hranljivim elementima. Za uspešnu proizvodnju rasada povrća najbolje se pokazao Kekkila profesionalni supstrat DSM 2W i koji pruža odlične uslove za početne faze razvoja mladih biljaka.

Usled čestog zalivanja nekvalitetnom vodom prilikom proizvodnje rasada povrća dolazi do intenzivnog ispiranja hranljivih elemenata iz supstrata u kome se biljka ukorenjava. Zbog toga je potrebno da se u toku proizvodnje rasada povrća primenjuje program prihrane bilja kroz zalivanje i folijarnu prihranu.

Zdrav i kvalitetan rasad je osnova profitabilne proizvodnje!



PARADAJZ
I PLAVI
PATLIDŽAN

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i svim pratećim neophodnim elementima:
FitoCrop Complex 12-11-18 ili 8-20-30+3S 5-7 kg/a + SQM Qrop K Plus 2-5 kg/a.
U nedostatku organske materije u zemljištu, preporučljiva je primena peletiranog stajskog đubriva **Ferti Plus 4-3-4**, u količini od 7 - 15 kg/a..

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima. Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju zalivnih tretmana.

Ukoliko se koristi **Energy Complete**, redukovati, ili isključiti kalcijum nitrat iz programa prihrane



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	SADNJA I UKORENJVANJE	VEGETATIVNI PORAST
	Koncentracija - % HUMISTART + BIOFLEX-L0.3 + 0.4	Koncentracija - % MAGNI-CAL B + AMINOFLEX 250.4 + 0.3
		
NPK + Mg+ME	grama/mililitara po biljci nedeljno ENERGY ROOT 8-55-10 ili START 10-45-10+ME + HUMISTART2 + 0.5	grama/mililitara po biljci nedeljno ENERGY COMPLETE A 14-7-15-CaO+ME ili TOMATO 12.5-6-31+4MgO+ME2 + 1
Ca		SQM UltraSol Calcium 1
		

* PRIMENITI U STRESNIM USLOVIMA

PRED CVETANJE - DO OTVARANJA CVETA	CVETANJE I INTENZIVNI PORAST PLODOVA	PLODONOŠENJE	INTENZIVNA BERBA
Koncentracija - % BORMAX 20 + BIOFLEX-L0.2 + 0.4	Koncentracija - % COMBIVIT COMPLEX 14 + MAGNI-CAL B0.2 + 0.4	Koncentracija - % CALCIUM ORGANO 30 + K-COMPLEX 200.25 + 0.3	Koncentracija - % K-COMPLEX 20 + CALCIUM ORGANO 300.5 + 0.2
			
grama/mililitara po biljci nedeljno ENERGY COMPLETE 10-5-20+CaO+2MgO+ME ili TOMATO 12.5-6-31+4MgO+ME4 + 3	grama/mililitara po biljci nedeljno ENERGY OPTIMUS 17-7-27+4CaO+ME + K-COMPLEX 204 + 1	grama/mililitara po biljci nedeljno ENERGY ACTIVE 15-5-33+2MgO + K-COMPLEX 204 + 1	grama/mililitara po biljci nedeljno FINALE 5-10-45+ME + K-COMPLEX 202.5 + 1
SQM UltraSol Calcium 1	SQM UltraSol Calcium 1	SQM UltraSol Calcium 1.5	
			

PAPRIKA

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i svim pratećim neophodnim elementima:
FitoCrop Complex 12-11-18 ili 8-20-30+3S 5-7kg/ar
+ SQM Qrop K Plus 2-5 kg/a.
U nedostatku organske materije u zemljištu, preporučljiva je primena peletiranog stajskog đubriva **Ferti Plus 4-3-4**, u količini od 7 - 15 kg/a.

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima. Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju zalivnih tretmana.

Ukoliko se koristi **Energy Complete**, redukovati, ili isključiti kalcijum nitrat iz programa prihrane



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	SADNJA I UKORENJEVANJE	VEGETATIVNI PORAST PRED CVETANJE	CVETANJE	PLODONOŠENJE	INTENZIVNA BERBA
	Koncentracija - % BIOFLEX-L + COMBIVIT COMPLEX 14 0.4 + 0.1	Koncentracija - % BIOFLEX-L + BORMAX 20 0.3 + 0.2	Koncentracija - % MAGNI-CAL B + AMINOFLEX 25 0.5 + 0.2	Koncentracija - % MAGNI-CAL B + K-COMPLEX 20 0.3 + 0.5	Koncentracija - % K-COMPLEX 20 + CALCIUM ORGANO 30 0.5 + 0.2
					
NPK + Mg+ME 	grama/mililitara po biljci nedeljno ENERGY ROOT 8-55-10 ili START 10-45-10+ME + HUMISTART 2 2 + 0.5	grama/mililitara po biljci nedeljno ENERGY COMPLETE A 14-7-15-CaO+ME 2	grama/mililitara po biljci nedeljno ENERGY COMPLETE 10-5-20+CaO+2MgO+ME + K-COMPLEX 20 3 + 1	grama/mililitara po biljci nedeljno ENERGY OPTIMUS 17-7-27+4CaO+ME + K-COMPLEX 20 3 + 1	grama/mililitara po biljci nedeljno ENERGY ACTIVE 15-5-33+2MgO + K-COMPLEX 20 3 + 1
Ca		SQM UltraSol Calcium	SQM UltraSol Calcium	SQM UltraSol Calcium	SQM UltraSol Calcium
					

* PRIMERENI U STRESNIM USLOVIMA



KRASTAVAC I KORNIŠON

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i svim pratećim neophodnim elementima:
FitoCrop Complex 12-11-18 ili 8-20-30+3S 5-7kg
+ SQM Qrop K Plus 2-5 kg/a.
U nedostatku organske materije u zemljištu, preporučljiva je primena peletiranog stajskog đubriva **Ferti Plus 4-3-4**, u količini od 7 - 15 kg/a..

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima. Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju zalivnih tretmana.

Ukoliko se koristi **Energy Complete**, redukovati, ili isključiti kalcijum nitrat iz programa prihrane



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	SADNJA I UKORENJAVANJE	VEGETATIVNI PORAST
	Koncentracija - % HUMISTART + BIOFLEX-L0.3 + 0.4	Koncentracija - % BORMAX 20 + BIOFLEX-L0.2 + 0.4
		
NPK + Mg+ME	grama/mililitara po biljci nedeljno ENERGY ROOT 8-55-10 ili START 10-45-10+ME + HUMISTART2 2 0.5	grama/mililitara po biljci nedeljno ENERGY BALANCE 20-10-20+3MgO ili KRISTAL 20-20-20+ME3 3 3
Ca		SQM UltraSol Calcium2
		

* PRIMENITI U STRESNIM USLOVIMA

POČETAK BERBE	PUNA BERBA
Koncentracija - % MAGNI-CAL B + AMINOFLEX 250.3 + 0.3	Koncentracija - % CALCIUM ORGANO 30 + K-COMPLEX 200.2 + 0.5
	
grama/mililitara po biljci nedeljno ENERGY OPTIMUS 17-7-27+4CaO+ME ili MELON 14-7-28+3,5MgO+ME HUMIFLEX (PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM)20 l/ha5 5	grama/mililitara po biljci nedeljno ENERGY ACTIVE 15-5-33+2MgO + K-COMPLEX 205 + 1
SQM UltraSol Calcium2	SQM UltraSol Calcium1,5
	



LUBENICA I DINJA

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i svim pratećim neophodnim elementima:
FitoCrop Complex 12-11-18 ili 8-20-30+3S 5-7kg
+ SQM Qrop K Plus 2-5 kg/a.
U nedostatku organske materije u zemljištu, preporučljiva je primena peletiranog stajskog đubriva **Ferti Plus 4-3-4**, u količini od 7 - 15 kg/a..

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima. Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju zalivnih tretmana.



Ukoliko se koristi **Energy Complete**, redukovati, ili isključiti kalcijum nitrat iz programa prihrane



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	SADNJA I UKORENJAVANJE		POČETAK CVETANJA		PORAST PLODOVA DO 70%		BERBA	
	Koncentracija - %		Koncentracija - %		Koncentracija - %		Koncentracija - %	
	HUMISTART + BIOFLEX-L	0.3 + 0.4	BORMAX 20 + BIOFLEX-L	0.2 + 0.4	MAGNI-CAL B + AMINOFLEX 25	0.3 + 0.3	K-COMPLEX 20 + CALCIUM ORGANO 30	0.3-05 + 0.2
								
NPK + Mg+ME 	grama/mililitara po biljci nedeljno		grama/mililitara po biljci nedeljno		grama/mililitara po biljci nedeljno		grama/mililitara po biljci nedeljno	
	ENERGY ROOT 8-55-10 ili START 10-45-10+ME + HUMISTART	10 5-10 + 2-4	ENERGY COMPLETE A 14-7-15-CaO+ME ili MELON 14-7-28+3,5 MgO+ME	15 10-15	ENERGY OPTIMUS 17-7-27+4CaO+ME ili MELON 14-7-28+3,5 MgO+ME	15 15-20	MELON 14-7-28+3,5 MgO+ME + FINALE 5-10-45+ME	20 + 5
Ca	SQM UltraSol Calcium	2-5	SQM UltraSol Calcium	10	SQM UltraSol Calcium	10	SQM UltraSol Calcium	5-10
								

* PRIMERENI U STRESNIM USLOVIMA



TIKVICA

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i svim pratećim neophodnim elementima:
FitoCrop Complex 12-11-18 ili 8-20-30+3S 5-7kg + SQM Qrop K Plus 2-5 kg/a.
U nedostatku organske materije u zemljištu, preporučljiva je primena peletiranog stajskog đubriva **Ferti Plus 4-3-4**, u količini od 7 - 15 kg/a..

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima. Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju zalivnih tretmana.

Ukoliko se koristi **Energy Complete**, redukovati, ili isključiti kalcijum nitrat iz programa prihrane



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	UKORENJAVANJE	INTENZIVAN PORAST	BERBA
	Koncentracija - % HUMISTART + BIOFLEX-L 0.3 + 0.4	Koncentracija - % BORMAX 20 + BIOFLEX-L 0.2 + 0.4	Koncentracija - % K-COMPLEX 20 + CALCIUM ORGANO 30 0.3-05 + 0.2
			
NPK + Mg+ME 	grama/mililitara po biljci nedeljno ENERGY ROOT 8-55-10 ili START 10-45-10+ME + HUMISTART 2 1.5 + 0.4	grama/mililitara po biljci nedeljno ENERGY COMPLETE A 14-7-15-CaO+ME 4	grama/mililitara po biljci nedeljno ENERGY OPTIMUS 17-7-27+4CaO+ME + K-COMPLEX 20 4 + 1
Ca		SQM UltraSol Calcium 3	SQM UltraSol Calcium 4
			

* PRIMENITI U STRESNIM USLOVIMA

SALATA, SPANAČ, BLITVA, ZAČINSKO BILJE

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i svim pratećim neophodnim elementima:
Fitocrop 12-11-18 5-7kg + SQM Qrop K Plus 2-5 kg/ a.
U nedostatku organske materije u zemljištu, preporučljiva je primena peletiranog stajskog đubriva **Ferti Plus 4-3-4**, u količini od 7 - 15 kg/a..

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po fenofazama razvoja. Ukoliko se tokom fenofaze zasad navodnjava više puta predviđenu količinu đubriva ravnomerno podeliti po broju zalivanja.



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	UKORENJAVANJE	FORMIRANJE ROZETE	DRUGI DEO VEGETACIJE
	Koncentracija - % HUMISTART + BIOFLEX-L 0.3 + 0.4	Koncentracija - % MAGNI-CAL B + AMINOFLEX 25 0.4 + 0.3	Koncentracija - % K-COMPLEX 20 + CALCIUM ORGANO 30 0.3-05 + 0.2
			
NPK + Mg+ME 	kg/ha po fenofazi START 10-45-10+ME + HUMISTART 40 + 10	kg/ha po fenofazi MELON 14-7-28+3.5MgO+ME + HUMIFLEX 50 20 l/ha	kg/ha po fenofazi FINALE 5-10-45+ME 60
Ca		SQM UltraSol Calcium 30	SQM UltraSol Calcium 30
			

* PRIMENITI U STRESNIM USLOVIMA

KUPUS,
KARFIOL,
BROKOLI,
KELJ,
PROKELJ

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i svim pratećim neophodnim elementima:
FitoCrop Complex 12-11-18 ili 8-20-30+3S 5-7kg + SQM Qrop K PLus 2-5 kg/a.
U nedostatku organske materije u zemljištu, preporučljiva je primena peletiranog stajskog đubriva **Ferti Plus 4-3-4**, u količini od 7 - 15 kg/a.

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po fenofazama razvoja. Ukoliko se tokom fenofaze zasad navodnjava više puta predviđenu količinu đubriva ravnomerno podeliti po broju zalivanja.

Ukoliko se koristi **Energy Complete**, redukovati, ili isključiti kalcijum nitrat iz programa prihrane



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	UKORENJAVANJE	FORMIRANJE ROZETE	DRUGI DEO VEGETACIJE
	Koncentracija - % HUMISTART + BIOFLEX-L 0.3 + 0.4	Koncentracija - % MAGNI-CAL B + AMINOFLEX 25 0.4 + 0.3	Koncentracija - % K-COMPLEX 20 + CALCIUM ORGANO 30 0.3-05 + 0.2
			
NPK + Mg+ME 	kg/ha po fenofazi ENERGY ROOT 8-55-10 ili START 10-45-10+ME + HUMISTART 40 40 + 10	kg/ha po fenofazi MELON 14-7-28+3.5MgO+ME + HUMIFLEX (PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM) 60 20 l/ha	kg/ha po fenofazi FINALE 5-10-45+ME 120
Ca		SQM UltraSol Calcium 40	SQM UltraSol Calcium 30
			

KROMPIR

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i svim pratećim neophodnim elementima:
Fitocrop 12-11-18 8-10kg + SQM Qrop K PLus 2-5 kg/a.
U nedostatku organske materije u zemljištu, preporučljiva je primena peletiranog stajskog đubriva **Ferti Plus 4-3-4**, u količini od 7 - 15 kg/a..

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po fenofazama razvoja. Ukoliko se tokom fenofaze zasad navodnjava više puta predviđenu količinu đubriva ravnomerno podeliti po broju zalivanja.

Ukoliko se koristi **Energy Complete**, redukovati, ili isključiti kalcijum nitrat iz programa prihrane



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	DO ZATVARANJA REDOVA	PUNO CVETANJE	NALIVANJE KRTOLA
	Koncentracija - % HUMISTART + BIOFLEX-L 0.3 + 0.4	Koncentracija - % BORMAX 20 + BIOFLEX-L 0.2 + 0.4	Koncentracija - % K-COMPLEX 20 + CALCIUM ORGANO 30 0.3-05 + 0.2
			
NPK + Mg+ME 	kg/ha po fenofazi ENERGY ROOT 8-55-10 ili START 10-45-40+ME + HUMISTART 30 40 + 10	kg/ha po fenofazi ENERGY ACTIVE 15-5-33+2MgO ili TOMATO 12.5-6-31+4MgO+ME 80 80	kg/ha po fenofazi FINALE 5-10-45+ME 80
Ca	SQM UltraSol Calcium 30	SQM UltraSol Calcium 50	
			

KORENASTO POVRĆE

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i svim pratećim neophodnim elementima:
FitoCrop Complex 12-11-18 ili 8-20-30+3S
5-7kg + SQM Qrop K Plus 2-5 kg/a.
U nedostatku organske materije u zemljištu, preporučljiva je primena peletiranog stajskog đubriva **Ferti Plus 4-3-4**, u količini od 7 - 15 kg/a..

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po fenofazama razvoja. Ukoliko se tokom fenofaze zasad navodnjava više puta, predviđenu količinu đubriva ravnomerno podeliti po broju zalivanja.

ŠARGAREPA, CVEKLA, CELER, REN



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	POČETAK RAZVOJA ROZETE	INTENZIVAN PORAST
	BORMAX 20 + BIOFLEX-L kg(l)/h 1 + 2	K-COMPLEX 20 + CALCIUM ORGANO 30 kg(l)/h 0.3-05 + 0.2
NPK + Mg+ME	kg/ha po fenofazi START 10-45-10+ME + HUMISTART 40 + 10	kg/ha po fenofazi FINALE 5-10-45+ME + HUMIFLEX (PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM) 130 20 l/ha
Ca	SQM UltraSol Calcium 40	SQM UltraSol Calcium 30

LUKOVIČASTO POVRĆE

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i svim pratećim neophodnim elementima:
Fitocrop 12-11-18 5-7kg + SQM Qrop K Plus 2-5 kg/a.
U nedostatku organske materije u zemljištu, preporučljiva je primena peletiranog stajskog đubriva **Ferti Plus 4-3-4**, u količini od 7 - 15 kg/a..

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po fenofazama razvoja. Ukoliko se tokom fenofaze zasad navodnjava više puta, predviđenu količinu đubriva ravnomerno podeliti po broju zalivanja.

CRNI LUK, BELI LUK, PRAZILUK



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	POČETAK RAZVOJA ROZETE	INTENZIVAN PORAST
	BORMAX 20 + BIOFLEX-L kg(l)/h 1 + 2	K-COMPLEX 20 + CALCIUM ORGANO 30 kg(l)/h 0.3-05 + 0.2
NPK + Mg+ME	kg/ha po fenofazi START 10-45-10+ME + HUMISTART 40 + 10	kg/ha po fenofazi FINALE 5-10-45+ME + HUMIFLEX (PRIMENITI ODVOJENO JEDNOM) 130 20 l/ha
Ca	SQM UltraSol Calcium 50	SQM UltraSol Calcium 50

MAHUNASTO POVRĆE

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i svim pratećim neophodnim elementima:
FitoCrop Complex 12-11-18 ili 8-20-30+3S 2-5 kg/a + SQM Qrop K PLus 2-5 kg/a.
U nedostatku organske materije u zemljištu, preporučljiva je primena peletiranog stajskog đubriva **Ferti Plus 4-3-4**, u količini od 7 - 15 kg/a.

PASULJ, GRAŠAK, BORANIJA



FOLIJARNO



FERTIGACIONO

FAZE	PRVI PAR PRAVIH LISTOVA	PRED CVETANJE	OBRAZOVANJE MAHUNA	POČETAK BERBE
	HUMISTART + BIOFLEX-L kg(l)/h 1 + 3	BORMAX 20 + BIOFLEX-L kg(l)/h 1 + 3	CALCIUM ORGANO 30 + AMINOFLEX 25 kg(l)/h 1 + 2	CALCIUM ORGANO 30 + K-COMPLEX 20 kg(l)/h 2 + 3
NPK + Mg+ME	kg/ha po fenofazi START 10-45-10+ME + HUMISTART 30 + 10	kg/ha po fenofazi TOMATO 12.5-6-31+4MgO+ME + BIOFLEX-L 40 + 5	kg/ha po fenofazi TOMATO 12.5-6-31+4MgO+ME + K-COMPLEX 20 40 + 5	kg/ha po fenofazi FINALE 5-10-45+ME 30
Ca				



BELEŠKE



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BELEŠKE



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



MILOŠ STOJANOVIĆ
DIREKTOR PRODAJE

- Dipl. inž. za melioracije zemljišta
- +381 63 41 47 22
- milos.stojanovic@fitofert.com

MILICA OBRENOVIĆ BOSIĆ
MARKETING MENADŽER

- Master inž. zaštite bilja
- +381 63 86 14 954
- milica.obrenovic@fitofert.com



FERTICO D.O.O.

Vojvode Putnika 94a, 22320 Indija, Srbija
tel: +381(0)22-802-802 | e-mail: info@fitofert.com | fitofert.com



DISTRIBUTERI:

- | | | |
|--|--|---|
| 1 SLOVENIJA,
SEMENARNA LJUBLJANA | 2 HRVATSKA,
CERERA AGRO | 3 MAĐARSKA,
KERT-PLUSZ |
| 4 RUMUNIJA,
MORAMI | 5 BUGARSKA,
ASBO-AGRO | 6 SEVERNA MAKEDONIJA,
HEMOMAK |
| 7 ALBANIJA,
AGROMARKET | 8 RUSIJA,
KOROLEV-AGRO AND YUG-POLIV | 9 JERMENIA,
VA-VA AGRO |
| 10 LIBAN,
AGRIMEDICA | | |



FERTICO D.O.O.

Vojvode Putnika 94a, 22320 Inđija

tel: +381 (0) 22-802-802

e-mail: info@fitofert.com



FITOFERT

FITOBIOTIC
Microbial Plant Nutrition

 **SPEED**

 **sea ENERGY**
plant nutrition

FitoCrop
COMPLEX

Fertiplus®

KEKKILÄ
PROFESSIONAL