

FITOFERT

WWW.FITOFERT.COM



fertico
www.ferticogarden.com

agromarket
www.agromarket.rs

PROIZVODNJA RASADA I UKORENJAVANJE POVRĆA

Proizvodnja rasada - za većinu povrtarskih kultura vreme proizvodnje rasada kreće se od 4 do 8 nedelja. Za normalan rast i razvoj mlađih biljaka potrebno je dosta svetlosti, vode, kao i hranljivih materija.


Prednosti proizvodnje iz rasada:

1. Ranije ubiranje plodova
2. Zaštićenost mlađih biljaka od temperaturnih šokova
3. Kontrolisana proizvodnja mlađih biljaka i uslova gajenja




1. Pri setvi, odnosno pre nicanja Zalivanje ili potapanje


FITOFERT HUMISTART 4:12:5 je organomineralno i biostimulativno hranivo u obliku koncentrovane suspenzije sa visokim sadržajem fosfora, huminskih, fulvinskih i amino kiselina, oplemenjeno ekstraktom algi i mikroelementima.
Zaštitna sredstva obezbeđuju biljke od svih sudovnih patogena.



2. 24h pre pikiranja Zalivanje ili potapanje



3. 24h pre sadnje Zalivanje ili potapanje



Od formiranja prvih pravih listova na 7 – 10 dana do kraja proizvodnje rasada i ukorenjavanja biljka Prskanje preko lista (Folijarno)



FITOFERT HUMISTART je dobro kombinovati sa preparatom **FITOFERT BIOFLEX-L** koji je univerzalni biostimulator. Formulisan je od komponenata prirodnog porekla, ekstakta algi, amino i organskih kiselina. U kombinaciji sa **HUMISTART**-om se po lepotu vremenu koristi **FITOFERT MAGNI-CAL B** naizmenično sa **BIOFLEX**-om na po 7 dana.

Priprema zemljišta za sadnju Pri formiranju bankova

KOREKTOR pH ZEMLJIŠTA




OSNOVNO ĐUBRIVO



ZEMLJIŠNI INSEKTICID



FORMIRANI BANKOVI





Prskanje preko lista (Folijarno)

Od prijema biljaka sprovoditi tretmane na svakih 7 dana u popodnevnim satima.



50ml/
10l vode



20ml/10l
vode

ili



50ml/
10l vode



30ml/10l
vode



15ml/10l
vode

Navedenim kombinacijama svake druge nedelje se dodaje i **FITOFERT AMINO COPPER 8** - proizvod na bazi bakra kompleksiranog organskim molekulima (Heptaglukonati, Lignosulfonati i EDTA). Pored nutritivnog dejstva FITOFERT AMINO COPPER 8 indukuje otpornost biljaka ka patogenim gljivama i bakterijama. Lak transport kompleksno vezanog bakra kroz biljna tkiva preventivno deluje na razvoj biljnih bolesti. Proizvod ispoljava jako preventivno delovanje.



Zalivanje

Pri sadnji biljaka



2g po biljci nedeljno

0.2g po biljci nedeljno

Uместо proizvoda
FITOFERT KRISTAL
10:40:10 može
se koristiti i
FITOFERT ENERGY
ROOT 5:55:10
u 30% manjoj
količini zbog veće
efikasnosti.

UKORENJAVANJE BILJAKA



agromarket
www.agromarket.rs

FITOFERT
WWW.FITOFERT.COM

fertico